

يجب على الوالدين إظهار بطاقة التحصين الخاصة بطفلهم كدليل على التحصينات (الحقن) قبل بدء مرحلة ما قبل روضة الأطفال (رعاية الطفل) وعند كل فحص في كل عمر بعد دخول المدرسة:

العمر عند دخول المدرسة/الفحص	الجرعات المطلوبة
2-3 شهر	1 شلل الأطفال 1 التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي 1 التهاب الكبد الوبائي B 1 المستدمية النزلية من النوع ب
4-5 شهر	2 شلل الأطفال 2 التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي 2 التهاب الكبد الوبائي B 2 المستدمية النزلية من النوع ب
6-14 شهر	2 شلل الأطفال 3 التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي 2 التهاب الكبد الوبائي B 2 المستدمية النزلية من النوع ب
15-17 شهر	شلل الأطفال 3 التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي 2 التهاب الكبد الوبائي B 1 المستدمية النزلية* (عند إتمام عام بعد الميلاد أو بعد ذلك) 1 الجدري المائي 1 الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية (عند إتمام عام بعد الميلاد أو بعد ذلك)
من عمر 18 شهرًا-5 أعوام	3 شلل الأطفال 4 التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي 3 التهاب الكبد الوبائي B 1 المستدمية النزلية* (عند إتمام العام الأول بعد الميلاد أو بعد ذلك) 1 الجدري المائي 1 الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية (عند إتمام العام الأول بعد الميلاد أو بعد ذلك)

\* يجب إعطاء جرعة واحدة من لقاح المستدمية النزلية عند إتمام العام الأول بعد الميلاد أو بعد ذلك بغض النظر عن الجرعات السابقة. مطلوب فقط للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام.

DTaP = ذوفان الخناق، ذوفان الكزاز، ولقاح السعال الديكي الإلخوي  
Hep B = لقاح الالتهاب الكبدي الوبائي B  
MMR = لقاح الحصبة، والنكاف، و الحصبة الألمانية  
Hib = لقاح المستدمية النزلية، النوع ب  
Varicella = لقاح جدري الماء