



¿Está embarazada?

Protégase a usted y a su bebé.

Hable con su médico sobre las infecciones que pueden afectarle a usted o a su bebé y cómo prevenirlas.

Lo Antes Posible Durante el Embarazo

Vacúnese contra la gripe y COVID-19 y reciba un refuerzo (bivalente) actualizado.



1. En la Primera Visita Prenatal

Hágase la prueba de:

- VIH
- sífilis
- hepatitis B y hepatitis C
- gonorrea y clamidia
- tuberculosis (si es de alto riesgo)
- inmunidad a la rubéola
- inmunidad a la varicela (si nunca ha tenido la vacuna o la enfermedad)



2. En el Tercer Trimestre (27 a 40 semanas)

- Vacúnese contra la tos ferina (DTP) durante cada embarazo (entre las semanas 27 y 36).
- Vuelva a hacerse la prueba de la sífilis (entre las semanas 28 y 32). Hágase la prueba del estreptococo del grupo B (entre las semanas 36 y 38).
- Pregúntele a su médico si debe hacerse la prueba de la hepatitis C, el VIH, la gonorrea o la clamidia (antes de las 36 semanas).



3. En el Parto

- Pregúntele a su proveedor de atención médica si debe hacerse la prueba del VIH, la sífilis o la hepatitis B en el momento del parto.
- Si padece de hepatitis B, hepatitis C o VIH, hable con su proveedor de atención médica para que le hagan la prueba a su bebé.

Consulte a su médico para obtener más información.

Para obtener más información,
escanee aquí.

