



Getting Your Child Tested For Lead



LEAD IS HARMFUL

Lead poisoning can make it hard for your child to learn, pay attention, or behave and may cause long-term health problems. Children may not look or act sick. Having your child tested for lead is the only way to know if there is lead in your child's body.

WHEN YOUR CHILD SHOULD BE TESTED FOR LEAD

A blood lead test is **required at one and two years old** if your child:

- Is in a program such as **Medi-Cal, WIC¹, or Head Start.**
- Lives in or spends a lot of time in a place built before 1978 that has peeling or chipped paint or that has been recently remodeled.

If these do not apply, ask your child's doctor about their risk of lead exposure. A blood lead test for lead is free for children enrolled in the programs listed above, and health insurance companies will also pay for the test.

CHILDREN ARE AT A HIGHER RISK FOR LEAD EXPOSURE IF THEY:

- **Live** in a house or building built before 1978 or near a source of lead air emissions such as highways, industrial sites, general aviation airports, recycling sites.
- **Consume or come in contact with** certain foods, spices, traditional remedies, dishware or other products.
- **Spend time** outside the U.S.
- **Have a sibling with** an elevated blood lead level.
- **Have a family member who works with lead** such as construction or painting or has hobbies that involve lead such as stained glass, fishing, pottery, firearms, antiques.

For a list of lead sources, ask your doctor or visit: go.cdph.ca.gov/LeadFreeKids

¹WIC is the Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children

WHAT TO EXPECT: BLOOD LEAD TESTING FOR YOUR CHILD



- 1** The test may be done at your child's doctor's office or at a laboratory.
 - 2** There are two methods of collecting blood for lead testing: capillary or venous. Capillary tests typically use blood taken from your child's finger. Venous tests use blood from a vein in your child's arm.
 - 3** Depending on the result, your child's doctor may order additional tests. Follow-up blood lead tests must be venous.
- i** For more information visit go.cdph.ca.gov/LeadFreeKids or contact your local Childhood Lead Poisoning Prevention Program:



10/2024



ການພາລູກ ຂອງທ່ານໄປຮັບ ການກວດສອບ ຫາສານຕະກົວ



ສານຕະກົວແມ່ນເປັນ ອັນຕະລາຍ

ຄວາມເປັນພິດຂອງສານຕະກົວສາມາດເຮັດໃຫ້ລູກຂອງທ່ານມີບັນຫາດ້ານການຮຽນຮູ້, ສະມາທິ ຫຼື ບັນຫາຄວາມປະພຶດ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ ບັນຫາສຸຂະພາບໃນໄລຍະຍາວ. ເດັກນ້ອຍອາດຈະບໍ່ ເບື້ອງວ່າເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ສະແດງອາການເຈັບປ່ວຍ. ການ ໃຫ້ລູກຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການກວດຫາສານຕະກົວ ເປັນວິທີດຽວທີ່ຈະຮູ້ວ່າມີສານຕະກົວຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ ຂອງລູກຂອງທ່ານ ຫຼື ບໍ່.

ລູກຂອງທ່ານຄວນໄດ້ຮັບ ການກວດຫາສານຕະກົວເມື່ອໃດ

ການກວດຫາສານຕະກົວໃນເລືອດແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງ ເຮັດເມື່ອເດັກນ້ອຍອາຍຸໜຶ່ງແລະສອງປີ ຖ້າລູກຂອງທ່ານ:

- ຢູ່ໃນໂຄງການເຊັ່ນ **Medi-Cal, WIC¹** ຫຼື **Head Start**.
- ອາໄສຢູ່ ຫຼື ໃຊ້ເວລາຫຼາຍໃນສະຖານທີ່ທີ່ສ້າງຂຶ້ນກ່ອນ ປີ 1978 ທີ່ສືບທາງຫຼວງອອກ ຫຼື ແຕກເປັນແຜ່ນ ຫຼື ມີການ ບັບປຸງໃໝ່ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.

ຖ້າສົງເໝີນີ້ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ຖາມທ່ານຫມໍຂອງລູກຂອງ ທ່ານກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບສານ ຕະກົວ. ການກວດເລືອດຫາສານຕະກົວແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າສຳລັບ ເດັກນ້ອຍທີ່ມີວິທະຍາສາດໃນໂຄງການທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ ແລະ ບໍ່ລິສັດປະກັນສຸຂະພາບຈະຈ່າຍຄ່າກວດສອບເຊັ່ນກັນ.

ເດັກນ້ອຍມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ ການໄດ້ຮັບສານຕະກົວຖ້າເຂົາເຈົ້າ:

- ອາໄສ ຢູ່ໃນເຮືອນຫຼືອາຄານທີ່ສ້າງຂຶ້ນກ່ອນປີ 1978 ຫຼື ຢູ່ໃກ້ກັບແຫຼ່ງການປ່ອຍອາຍພິດທາງອາກາດເຊັ່ນ: ທາງ ດ່ວນ, ສະຖານປະກອບການອຸດສາຫະກຳ, ສະໜາມບິນ ການບິນທົ່ວໄປ, ສະຖານທີ່ລົດໃຊ້ເຄື່ອງ.
- ບໍ່ລະມັດລະວັງສຳຜັດກັບ ອາຫານບາງຊະນິດ, ເຄື່ອງເທດ, ການຮັກສາແຜ່ນໄບຮານ, ຖ້ວຍຊາມ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ.
- ໃຊ້ເວລາ ຢູ່ນອກສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ
- ມີອ້າຍເຈື່ອຍນ້ອງທີ່ມີ ລະດັບສານຕະກົວໃນເລືອດສູງ.
- ມີສະມາຊິກໃນຄອບຄົວທີ່ເຮັດວຽກກັບສານ ຕະກົວ ເຊັ່ນ: ການກໍ່ສ້າງຫຼື ການສົ່ງເສີມວິຊາກະດິລກາທິ ກ່ຽວຂ້ອງກັບສານຕະກົວ ເຊັ່ນ: ແກ້ວສີ, ການຫາປາ, ເຄື່ອງບິນດິນເຜົາ, ອາວຸດບິນ, ວັດຖຸບູຮານ.

ສຳລັບລາຍການແຫຼ່ງທີ່ມີຂອງສານຕະກົວ ສອບຖາມ ທ່ານໝໍຂອງທ່ານ ຫຼື ໄປທີ່:
go.cdph.ca.gov/LeadFreeKids

ສົງເໝີທາງດ້ານ: ການກວດເລືອດ ຫາສານຕະກົວ ສຳລັບລູກຂອງ ທ່ານ



- 1** ການກວດສອບອາດຈະເຮັດຢູ່ຫ້ອງການທ່ານໝໍ ຂອງລູກຂອງທ່ານ ຫຼື ຢູ່ຫ້ອງທົດລອງ.
 - 2** ມີສອງວິທີໃນການເກັບຕົວຢ່າງເລືອດເພື່ອກວດ ຫາສານຕະກົວ: ທາງເສັ້ນເລືອດຜ່ອຍ ຫຼື ເສັ້ນ ເລືອດໃຫຍ່. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ການກວດທາງ ເສັ້ນເລືອດຜ່ອຍຈະໃຊ້ເລືອດທີ່ໄດ້ຈາກນ້ຳມືຂອງ ລູກຂອງທ່ານ. ການກວດທາງເສັ້ນເລືອດໃຫຍ່ ຈະໃຊ້ເລືອດຈາກເສັ້ນເລືອດຢູ່ໃນແຂນຂອງລູກ ຂອງທ່ານ.
 - 3** ທ່ານໝໍຂອງລູກຂອງທ່ານອາດຈະສົ່ງໃຫ້ກວດ ເພີ່ມເຕີມ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜົນໄດ້ຮັບ. ການກວດ ເລືອດຕິດຕາມຜົນຈະຕ້ອງເປັນການກວດທາງ ເສັ້ນເລືອດໃຫຍ່.
- i** ຖ້າຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ໄປທີ່ **go.cdph.ca.gov/LeadFreeKids** ຫຼື ຕິດຕໍ່ ໂຄງການປ້ອງກັນການເປັນພິດຈາກສານຕະກົວ ໃນໄວເດັກຂອງທ່ານ:



(Lao) 10/2024

¹WIC ແມ່ນໂຄງການໂພຊະນາການເສີມພິເສດສຳລັບແມ່ຍິງ, ແອນອ້ອຍ ແລະ ເດັກນ້ອຍ