

Getting
Your Child
Tested For
Lead



LEAD IS HARMFUL

Lead poisoning can make it hard for your child to learn, pay attention, or behave and may cause long-term health problems. Children may not look or act sick. Having your child tested for lead is the only way to know if there is lead in your child's body.

WHEN YOUR CHILD SHOULD BE TESTED FOR LEAD

A blood lead test is **required at one and two years old** if your child:

- Is in a program such as Medi-Cal, WIC¹, or Head Start.
- Lives in or spends a lot of time in a place built before 1978 that has peeling or chipped paint or that has been recently remodeled.

If these do not apply, ask your child's doctor about their risk of lead exposure. A blood lead test for lead is free for children enrolled in the programs listed above, and health insurance companies will also pay for the test.

CHILDREN ARE AT A HIGHER RISK FOR LEAD EXPOSURE IF THEY:

- **Live** in a house or building built before 1978 or near a source of lead air emissions such as highways, industrial sites, general aviation airports, recycling sites.
- Consume or come in contact with certain foods, spices, traditional remedies, dishware or other products.
- **Spend time** outside the U.S.
- Have a sibling with an elevated blood lead level.
- Have a family member who works with lead such as construction or painting or has hobbies that involve lead such as stained glass, fishing, pottery, firearms, antiques.

For a list of lead sources, ask your doctor or visit: **go.cdph.ca.gov/LeadFreeKids**

¹WIC is the Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children

WHAT TO EXPECT: BLOOD LEAD TESTING FOR YOUR CHILD



- The test may be done at your child's doctor's office or at a laboratory.
- There are two methods of collecting blood for lead testing: capillary or venous. Capillary tests typically use blood taken from your child's finger. Venous tests use blood from a vein in your child's arm.
- Depending on the result, your child's doctor may order additional tests. Follow-up blood lead tests must be venous.
- For more information visit go.cdph.ca.gov/LeadFreeKids or contact your local Childhood Lead Poisoning Prevention Program:







© 2024, California Department of Public Health

د څه تمه ولرئ: ستاسي ماشوم لپاره د وينې د سرپو معاينه



- معاینه کیدای شي ستاسو د ماشوم د ډاکټر په دفتر یا لابراتوار کې ترسره شي.
- د لیډ معاینی لپاره د وینی راټولولو دوه میتودونه شتون الري: كيپيلري يا وينس. د كيپيلري معايني معمولاً ستاسي د ماشوم له ګوتو څخه اخیستل شوي وینه کاروي. د وينس معاينه ستاسي د ماشوم په لاس کې د رګ څخه وينه کاروي.
 - ستاسي پايلې پام كې نيولو سره، ستاسې د ماشوم ډاکټر کېدای شی د اضافی معایناتو امر وکړي. د وینی سرپو تعقیبی معاینات باید وینس وي.
- د نورو معلوماتو لپاره لیدنه وکړئ ا go.cdph.ca.gov/LeadFreeKids سره یا اړیکه ونیسئ یا خپل سیمهییز د ماشومتوب د سرپو مسمویت څخه د مخنیوی پروګرام سره اړیکه ونیسئ:













په يو او دوه کلنۍ کې د وينې سرپو معاينه اړينه کله چې ستاسى ماشوم:

- د WIC¹ ، Medi-Cal ، یا هېد سټارټ په څېر یو پروګرام
- په هغه ځای کې ژوند کوي یا ډېر وخت تېروي چې د 1978 څخه مخکی جوړ شوی وي چې پوټکي يا چپه شوي رنګ لري يا پدې وروستيو کې له سره جوړ شوی وي.

که دا د تطبیق وړ نه وي، خپل د ماشوم ډاکټر څخه د سرپو په معرض کې د واقع کېدو خطر په اړه پوښتنه وکړئ. د سرپو لپاره د ويني د سرپو معاينه د هغو ماشومانو لپاره وړيا ده چې پورته ليست شويو پروګرامونو کې شامل شوي، او د روغتيايي بيمي شرکتونه به هم د معاینی بیسی ورکری.

ماشومان د سرپو په معرض کې د واقع كبدو لوړ خطر سره مخ دی که چېری هغوی:

- په هغه کور يا ودانۍ کې **ژوند وکړي** چې د 1978 څخه مخکی جوړ شوی يا د سرپو د هوا د اخراج سرچيني ته لکه لویی لاری، صنعتی سایتونه، عمومی هوایی ډګرونه، د ريسايكل سايټونو ته نږدې وي.
 - د ځانګړو خوړو، مسالو، دودیزو درملو، لوښو یا نورو محصولات مصرف كرئ يا وسره په اړيكه كى شئ.
 - د متحده ايالاتو څخه بهر وخت تير کړئ.
 - داسې خور يا ورور ولرئ چې د وينې د سرپو کچه يې
- د کورنۍ داسې غړی ولري چې د لیډ سره کار کوي لکه ودانيز يا نقاشي يا داسي شوقونه لري چي سرپ په كي شامل وي لكه داغ شوي شيشي ، كب نيول، لوبني، اور وژني،
- د مخكښو سرچينو ليست لپاره، له خپل ډاكټر څخه پوښتنه وكړئ يا ليدنه وكړئ: go.cdph.ca.gov/LeadFreeKids

ا WIC د ښځو، کوچنيانو او ماشومانو لپاره د تغذيي ځانګړي اضافي پروګرام دي

خيل ماشوم د سرپو لپاره معاينه كول



سرپ مضر دی

د سرپو مسمومیت کولی شي ستاسو ماشوم ته زده کړه، پاملرنه، يا چلند ستونز من کړي او ممکن د اوږدې مودې روغتيا ستونزې رامنځته کړي. ماشومان ممکن ناروغ ښکاره نشی يا داسې عمل ونه کړي. خپل ماشوم د سرپو لپاره معاينه کول د دې پوهېدلو چې ايا ستاسي ماشوم په بدن کی سرپ شته که نه یوازینی لاره ده.