

# صحيفة وقائع: جونسون آند جونسون مزايا ومخاطر لقاح كوفيد-19

افهم مخاطر ومزايا تلقي لقاح كوفيد-19 أحادي الجرعة من جونسون آند جونسون، والذي قد يمنع إصابتك بفيروس كوفيد-19. إن تلقي هذا اللقاح يرجع لاختيارك. تحدث إلى مقدم خدمات التطعيم إذا كانت لديك أسئلة.

## حول هذا اللقاح

هذا لقاح غير معتمد ولا يزال قيد الدراسة في التجارب الإكلينيكية. أذنت إدارة الغذاء والدواء (FDA) باستخدامه في حالات الطوارئ للوقاية من الإصابة بكوفيد-19 لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكبر. هذا اللقاح مكون من جرعة واحدة تُحقن في العضل.

## قبل تلقي اللقاح

أخبر مقدم خدمات التطعيم عن جميع حالاتك الطبية، بما في ذلك إذا كنت:

- تعاني من أي حساسية
- لديك حمى
- تعاني من اضطراب النزيف أو تتناول مميعات الدم
- تعاني من نقص المناعة أو تتناول دواءً يؤثر على جهازك المناعي
- حاملاً أو ترضعين أو تخططين للحمل
- قد تلقيت لقاحاً آخر لكوفيد-19

## ينبغي عدم حصولك على هذا اللقاح إذا:

كنت تعاني من تفاعل تحسسي حاد تجاه أي مكون من مكونات هذا اللقاح: الفيروس الغدي المؤتلف غير المؤهل للنسخ المتماثل من النوع 26 الذي يعبر عن البروتين الشوكي سارس-كوف-2 (SARS-CoV-2)، وأحادي هيدرات حمض الستريك، وثنائي هيدرات سترات ثلاثي الصوديوم، والإيثانول، و 2-هيدروكسيبروبيل-بيتا-سيكلوديسترين (HBCD)، وبولي سوربات-80، وكلوريد الصوديوم.

## مزايا هذا اللقاح

في تجربة سريرية جارية، ثبت أن هذا اللقاح يقي من الإصابة بالمرض أو الاحتجاز بالمستشفى أو الوفاة جراء التعرض لكوفيد-19 بعد تلقي جرعة واحدة. مدة الحماية ضد فيروس كوفيد-19 غير معروفة حالياً.

## هناك مخاطر مرتبطة بهذا اللقاح

- الآثار الجانبية العامة: تشمل الآثار الجانبية التي تم الإبلاغ عنها مع هذا اللقاح تفاعلات في موضع الحقن والصداع والشعور بالتعب الشديد وآلام العضلات والغثيان والحمى.
- تفاعلات تحسسية حادة: يوجد احتمال بعيد في أن يتسبب اللقاح في حدوث تفاعل تحسسي حاد (صعوبة في التنفس، تورم في الوجه والحلق، سرعة ضربات القلب، طفح جلدي شديد في جميع أنحاء الجسم، دوار، ضعف)، والذي قد يحدث عادةً بعد بضع دقائق إلى ساعة واحدة من تلقي الجرعة.
- التجلطات الدموية: حدثت تعرض لتجلطات دموية تنطوي على الأوعية الدموية في الدماغ والبطن والساقين؛ إلى جانب انخفاض مستويات خلايا الدم التي تساعد جسمك على وقف النزيف، بشكل نادر لدى بعض الأشخاص الذين تلقوا لقاح كوفيد-19 من جونسون آند جونسون. وقد بدأت الأعراض لدى الأشخاص الذين تعرضوا لهذه التجلطات الدموية بعد أسبوع إلى أسبوعين تقريباً من التطعيم وكان معظمهم من النساء دون سن الخمسين. ينبغي عليك طلب الحصول على العناية الطبية على الفور إذا ظهرت عليك أي من الأعراض التالية بعد عدة أيام من تلقي اللقاح: ضيق النفس أو ألم في الصدر أو تورم في الساقين أو ألم مستمر بالبطن أو صداع شديد أو عدم وضوح الرؤية أو سهولة التكدم أو ظهور بقع دموية صغيرة تحت الجلد خارج موضع الحقن.

## إذا كنت تعاني من آثار جانبية

إذا كنت تعاني من تفاعل تحسسي حاد، اتصل بالرقم 1-800-911-911، أو اذهب إلى أقرب مستشفى. اتصل بمقدم خدمات التطعيم أو مقدم خدمات الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت تعاني من أي آثار جانبية تزعجك أو لا تزول.

## خيارات أخرى للحد من انتشار مرض كوفيد-19

إن تلقي هذا اللقاح يرجع لاختيارك ولن يغير عدم الحصول عليه من رعايتك الطبية القياسية. تتوفر لقاحات أخرى للوقاية من الإصابة بكوفيد-19.

## لمزيد من المعلومات

قم بزيارة [www.janssencovid19vaccine.com](http://www.janssencovid19vaccine.com)

أو [www.cdc.gov/coronavirus](http://www.cdc.gov/coronavirus)

اتصل على الرقم 1-800-565-4008 أو 455-9922 (908)

مقتبس من صحيفة حقائق FDA للمتلقين ومقدمي الرعاية

