

자료표: 존슨 앤 존슨(Johnson & Johnson) 코로나-19 백신 혜택과 위험성

단 회 접종으로 COVID-19 감염을 예방할 수 있는 존슨 앤 존슨 사의 COVID-19 백신 접종의 위험성과 혜택을 이해하시기 바랍니다. 해당 백신을 접종하는 것은 귀하의 선택입니다. 궁금한 사항은 예방 접종 서비스 제공자에게 문의하시기 바랍니다.

백신 정보

다른 모든 COVID-19 백신과 마찬가지로 FDA는 COVID-19 팬데믹의 심각성을 고려하여 이 백신의 비상 투약을 승인하였습니다. 이 백신은 단 회 접종 근육 주사입니다.

백신 예방 접종 전

예방 접종 서비스 제공자에게 다음을 포함하여 귀하의 모든 건강 상태를 설명하여 주십시오:

- 알레르기가 있는 경우
- 발열 상태인 경우
- 출혈성 질환이 있거나 혈액 응고 억제제를 복용 중인 경우
- 면역력이 손상/약화된 상태이거나 면역 체계에 영향을 줄 수 있는 약을 복용 중인 경우
- 임신 중이거나 모유 수유 중이거나 임신할 계획이 있는 경우
- 다른 COVID-19 백신을 접종한 경우

다음에 해당하는 경우에는 이 백신을 접종하지 않아야 합니다: 이 백신 성분이 심각한 알레르기 반응을 자극하였습니다: SARS-CoV-2 스파이크 단백질(코로나바이러스의 막 단백질)을 발현하는 재조합, 복제 불능 아데노 제26형 바이러스, 구연산 단일수화물, 구연산염 3 나트륨 2수화물, 에탄올, 2-하이드록시 프로필-β-시클로덱스트린(HBCD), 폴리소르베이트-80, 염화나트륨.

이 백신의 혜택

진행 중인 임상 시험 단계에서 이 백신은 단일 투여 후 COVID-19 감염으로 인한 질병 발발, 입원 또는 사망을 예방하는 것으로 입증되었습니다. 현재로서는 COVID-19감염에 대한 면역 기간은 알려진 바가 없습니다.

이 백신과 관련된 위험성

- **일반 부작용:** 이 백신 접종과 관련된 부작용으로는 주사 부위의 반응과 두통, 심한 피로감, 근육통, 메스꺼움 및 발열이 보고되었습니다.
- **심한 알레르기 반응:** 희박하기는 하나, 백신 접종 직후 몇 분부터 한 시간 이내에 심각한 알레르기 반응(호흡 곤란, 얼굴과 목 부위의 부기, 심장 박동 수 증가, 전신 발진, 현기증, 쇠약함)을 유발할 가능성이 있습니다.
- **혈전:** 뇌, 복부 및 다리 부위의 혈관을 포함하는 혈전; 신체의 출혈이 멎는데 도움이 되는 낮은 혈구 세포 수준을 동반한 사례가 존슨 앤 존슨 COVID-19 백신을 접종한 일부 사람들에게서 희박하게 발생하였습니다. 이러한 혈전 증세가 발발한 사람들은 증상이 예방 접종 후 약 1-2 주 후 시작되었으며 대부분이 만50세 미만의 여성이었습니다. 백신 접종 후 며칠 후 다음과 같은 증상이 발발하면, 즉시 의사의 진료를 받아야 합니다: 숨가쁨, 가슴 통증, 다리 부종, 지속적인 복통, 심한 두통 또는 시력이 흐려지거나 쉽게 멍이 들거나 주사 부위가 아닌 부위의 피부면 아래에 작은 혈반이 나타나는 경우.

부작용을 경험하는 경우

심한 알레르기 반응이 나타나는 경우, 9-1-1로 전화하거나 가장 가까운 병원을 찾으십시오. 부작용으로 인한 불편함이 지속되는 경우, 예방 접종 서비스 제공자 또는 의료 서비스 제공자에게 문의하시기 바랍니다.

COVID-19 감염 예방을 위한 기타 옵션

이 백신을 접종하는 것은 귀하의 선택이며 백신을 접종하지 않음으로 해서 귀하의 표준 의료 서비스가 변경되지는 않습니다. COVID-19감염을 예방할 수 있는 다른 백신을 이용하실 수 있습니다.

추가 정보

www.janssencovid19vaccine.com 사이트 또는 www.cdc.gov/coronavirus 사이트를 참조하시기 바랍니다.

1-800-565-4008번 또는 (908) 455-9922 번으로 문의하시기 바랍니다.

FDA(미국 식품의약청) 발표 수혜자 및 간병인을 위한 자료표를 참조하여 제작하였습니다.

