

# ФАКТЫ: вакцина Johnson & Johnson от COVID-19, польза и риск



Компания Johnson & Johnson производит вакцину, защищающую от болезни COVID-19. Вводят ее только один раз. Здесь говорится о пользе от этой вакцины и риске, связанном с ее применением. Делать прививку этой вакциной или нет, решаете только вы. С вопросами обращайтесь к своему врачу.

## Об этой вакцине

Учитывая серьезность пандемии COVID-19, Управление по контролю качества продуктов питания и лекарств (FDA) разрешило применять эту вакцину, как и все остальные вакцины от COVID-19, в сложившейся чрезвычайной ситуации. Вводят ее однократно внутримышечно.

## Прежде чем делать прививку

Расскажите медику, который будет делать вам прививку, о своих болезнях и симптомах:

- есть ли у вас какие-нибудь аллергии,
- высокая ли у вас температура,
- нарушена ли у вас свертываемость крови и принимаете ли вы антикоагулянты,
- нарушен ли у вас иммунитет и принимаете ли вы иммуносупрессанты,
- беременны ли вы, собираетесь ли забеременеть и кормите ли грудью,
- прививались ли вы прежде другой вакциной от COVID-19.

## Прививка противопоказана в следующих случаях:

У вас уже была тяжелая аллергическая реакция на любой из компонентов вакцины: нереплицирующийся аденовирус ad26 с геном spike-белка вируса SARS-CoV-2, моногидрат лимонной кислоты, дигидрат тринатрийцитрата, этанол, 2-гидроксипропил-β-циклодекстрин, полисорбат-80, хлористый натрий.

## Польза от вакцины

В незаконченном клиническом исследовании одна доза вакцины предупреждает развитие болезни COVID-19, необходимость в госпитализации и смерть от этой болезни. Сколько времени прививка защищает от COVID-19, пока неизвестно. Данные взяты из [Информационного листка FDA для людей, прививающихся вакциной Johnson & Johnson, и тех](#)

## Риск, связанный с этой вакциной

- **Побочные явления общего характера.** Сообщалось о следующих побочных явлениях: реакция в месте укола, головная боль, чувство усталости, мышечные боли, тошнота и высокая температура.
- **Тяжелые аллергические реакции.** В редких случаях вакцина вызывает тяжелую аллергическую реакцию (затрудненное дыхание, отек лица и горла, сердцебиение, тяжелые высыпания по всей поверхности тела, головокружение, слабость). Реакция обычно развивается в первые минуты (до часа) после введения вакцины.
- **Тромбы.** После прививки вакциной Johnson & Johnson изредка происходило снижение числа тромбоцитов (клетки, останавливающие кровотечение) с одновременным образованием тромбов в мозгу, органах брюшной полости и ногах. Тромбоз развивался примерно через 1-2 недели после вакцинации. Это осложнение чаще наблюдалось у женщин младше 50 лет. Сразу обратитесь к врачу, если в первые несколько дней после прививки у вас появился один из следующих симптомов: одышка, боль в груди, отечность ног, постоянная боль в животе, сильная головная боль, размытое зрение, склонность к появлению синяков или мелких подкожных кровоизлияний за пределами места укола.

## Если у вас появились побочные явления

Если у вас тяжелая аллергическая реакция, позвоните в службу 9-1-1 или обратитесь в ближайшую больницу. Если побочные явления сильно вас беспокоят или не проходят, позвоните своему врачу или в учреждение, где делают прививки.

## Другие способы предупреждения COVID-19

Делать прививку этой вакциной или нет, решаете только вы. Даже если вы не сделаете прививку, это никак не повлияет на возможность получать обычную медицинскую помощь. Существуют также другие вакцины против COVID-19.

## Подробнее

Воспользуйтесь сайтом [www.janssencovid19vaccine.com](http://www.janssencovid19vaccine.com) или [www.cdc.gov/coronavirus](http://www.cdc.gov/coronavirus)

Позвоните по телефону 1-800-565-4008 или (908) 455-9922



[кто за ними ухаживает \(FDA Fact Sheet for Recipients and Caregivers\)](#)