

# ข้อมูลสำคัญ: จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ประโยชน์และความเสี่ยงของวัคซีนโควิด-19

เข้าใจความเสี่ยงและประโยชน์ของการรับวัคซีนโควิด-19 แบบโดสเดียวของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ซึ่งอาจช่วยป้องกันคุณจากโควิด-19 การตัดสินใจที่จะรับวัคซีนนี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณ หากมีคำถามหรือข้อสงสัย โปรดพูดคุยกับผู้ให้บริการฉีดวัคซีน

## เกี่ยวกับวัคซีนนี้

เช่นเดียวกับวัคซีนโควิด-19 ทุกตัว FDA อนุญาตให้ใช้วัคซีนนี้เป็นกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากความรุนแรงของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 วัคซีนนี้เป็นวัคซีนโดสเดียวที่ฉีดเข้าในกล้ามเนื้อ

## ก่อนรับวัคซีน

บอกผู้ให้บริการวัคซีนว่าคุณมีโรคประจำตัวอะไรบ้าง รวมถึงว่าคุณมีภาวะต่อไปนี้หรือไม่

- เป็นภูมิแพ้
- มีไข้
- มีภาวะเลือดออกผิดปกติหรือกำลังใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด
- มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือกำลังใช้ยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของคุณ
- กำลังตั้งครรภ์ ให้นมบุตร หรือกำลังพยายามตั้งครรภ์
- ได้รับวัคซีนโควิด-19 อีกตัวหนึ่งไปแล้ว

## คุณไม่ควรรับวัคซีนนี้ หาก:

คุณมีอาการแพ้อย่างรุนแรงต่อส่วนผสมใด ๆ ของวัคซีนนี้ นั่นคือ อดีโนไวรัสลูกผสมประเภท 26 ที่ไร้ความสามารถในการจำลองตัวเอง ซึ่งมีโปรตีนหนาม SARS-CoV-2, ซิตริกแอซิดโมโนไฮเดรต, ไตรโซเดียมซีเตรตไดไฮเดรต, เอทานอล, 2-ไฮโดรซีโพรพิล-เบต้า-ไซโคลเดกตริน (HBCD), โพลีซอร์เบต-80, โซเดียมคลอไรด์

## ประโยชน์ของวัคซีนนี้

ในการทดลองทางคลินิกที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าวัคซีนนี้ป้องกันการเจ็บป่วย การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือการเสียชีวิตจากโควิด-19 หลังจากที่ได้รับวัคซีนโดสเดียว ปัจจุบัน ยังไม่ทราบว่าวัคซีนนี้จะป้องกันโควิด-19 ได้เป็นระยะเวลานานเพียงใด

## ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนนี้

- **ผลข้างเคียงทั่วไป:** ผลข้างเคียงที่พบจากวัคซีนนี้ ได้แก่ ปฏิกิริยาตรงจุดที่ฉีด และอาการปวดศีรษะ รู้สึกเหนื่อยมาก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ และมีไข้
- **ปฏิกิริยาการแพ้อย่างรุนแรง:** มีโอกาสน้อยมากที่วัคซีนอาจทำให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง (หายใจลำบาก ใบหน้าและลำคอบวม หัวใจเต้นเร็ว มีผื่นขึ้นทั่วร่างกาย เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย) ซึ่งมักจะเกิดขึ้นภายในไม่กี่นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงหลังจากได้รับวัคซีน
- **ลิ่มเลือดอุดตัน:** ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดในสมอง ช่องท้อง และขา และเซลล์เม็ดเลือดที่ช่วยให้เลือดหยุดไหลมีระดับต่ำ เกิดขึ้นน้อยมากในบางคนที่ได้รับวัคซีนไวรัลโควิด-19 ของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ในผู้ที่เกิดลิ่มเลือดอุดตัน อาการจะเริ่มหลังฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ 1-2 สัปดาห์ และส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงอายุน้อยกว่า 50 ปี คุณควรไปพบแพทย์ทันที หากมีอาการดังต่อไปนี้หลังจากได้รับวัคซีนแล้วหลายวัน: หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก ขาบวม ปวดท้องเป็นเวลานาน ปวดศีรษะรุนแรง หรือตาพร่ามัว ช้ำง่าย หรือมีจุดห้อเลือดเล็ก ๆ ใต้ผิวหนัง นอกเหนือจากบริเวณที่ฉีด

## หากคุณมีอาการข้างเคียง

หากคุณมีอาการแพ้อย่างรุนแรง โปรดโทรศัพท์ถึง 9-1-1 หรือไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด โทรศัพท์ถึงผู้ให้บริการฉีดวัคซีนหรือผู้ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลของคุณ หากมีผลข้างเคียงที่สร้างความรำคาญแก่คุณหรือเกิดผลข้างเคียงเป็นเวลาหลายวัน

## วิธีอื่นในการป้องกันโควิด-19

การตัดสินใจที่จะรับวัคซีนนี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณ การไม่รับวัคซีนนี้ไม่ทำให้การรักษาพยาบาลปกติของคุณเปลี่ยนไป มีวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตัวอื่นให้

## ข้อมูลเพิ่มเติม

ไปที่ [www.janssencovid19vaccine.com](http://www.janssencovid19vaccine.com) หรือ [www.cdc.gov/coronavirus](http://www.cdc.gov/coronavirus)

โทรศัพท์ถึง 1-800-565-4008 หรือ (908) 455-9922

ดัดแปลงมาจาก [ข้อมูลสำคัญจาก FDA สำหรับผู้รับและผู้ดูแล](#)

