

# TRANG THÔNG TIN: Johnson & Johnson Lợi Ích và Rủi Ro từ Vắc-xin COVID-19

Hiểu những lợi ích và rủi ro từ việc tiêm vắc-xin COVID-19 một liều của Johnson & Johnson có khả năng phòng chống nhiễm COVID-19. Tiêm loại vắc-xin này hay không hoàn toàn thuộc quyền lựa chọn của quý vị. Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng trao đổi với nhà cung cấp vắc-xin.

## Giới Thiệu về Vắc-xin

Giống như tất cả các vắc-xin COVID-19, vắc-xin này đã được FDA phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp do mức độ nghiêm trọng của đại dịch COVID-19. Vắc-xin này là loại tiêm một liều vào cơ.

## Trước Khi Tiêm Vắc-xin

Trao đổi với nhà cung cấp vắc-xin về tình trạng sức khỏe của quý vị, bao gồm nếu quý vị:

- bị dị ứng
- bị sốt
- bị bệnh máu khó đông hoặc đang sử dụng thuốc chống đông máu
- bị suy giảm miễn dịch hoặc đang dùng thuốc có ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch
- đang mang thai, cho con bú, hoặc có kế hoạch có thai
- đã tiêm một loại vắc-xin COVID-19 khác.

## Quý Vị Không Nên Tiêm Vắc-xin Này Nếu:

Quý vị bị dị ứng nghiêm trọng với một trong những thành phần của vắc-xin như: gen tái tổ hợp, Ad26 có protein sợi SARS-CoV-2, citric acid monohydrate, trisodium citrate dihydrate, ethanol, 2-hydroxypropyl- $\beta$ -cyclodextrin (HBCD), polysorbate-80, sodium chloride.

## Lợi Ích từ Vắc-xin

Vắc-xin này được chứng minh là có thể phòng chống bệnh, ngừa nhập viện, hoặc tử vong từ COVID-19 sau khi tiêm một liều duy nhất, từ một thử nghiệm lâm sàng hiện đang được thực hiện. Thời hạn phòng chống COVID-19 hiện chưa rõ.

## Rủi Ro Liên Quan Đến Vắc-xin

- **Các tác Dụng Phụ Phổ Biến:** Các tác dụng phụ được biết đến đối với loại vắc-xin này bao gồm phản ứng tại chỗ tiêm, đau đầu, cảm thấy mệt mỏi, đau cơ, buồn nôn, và sốt.
- **Dị Ứng Nghiêm Trọng:** Có khả năng rất rất nhỏ là loại vắc-xin này có thể gây ra dị ứng nghiêm trọng (khó thở, sưng mắt và viêm họng, tim đập nhanh, phát ban khắp cơ thể, chóng mặt, suy nhược), mà thường sẽ xảy ra sau vài phút đến một tiếng từ khi tiêm.
- **Huyết Khối:** Huyết khối (cục máu đông) liên quan đến các mạch máu ở não, bụng và chân; cùng với tỷ lệ tế bào máu thấp có tác dụng giúp cơ thể cầm máu, hiếm khi xảy ra ở những người được tiêm vắc-xin COVID-19 của Johnson & Johnson. Ở những người đã hình thành huyết khối, thì các triệu chứng bắt đầu vào khoảng 1-2 tuần sau khi tiêm vắc-xin và hầu hết đã xảy ra ở những phụ nữ dưới 50 tuổi. Quý vị cần đi khám ngay khi có những triệu chứng sau đây sau vài ngày tiêm vắc-xin: khó thở, đau ngực, sưng chân, đau bụng dai dẳng, nhức đầu dữ dội, mắt mờ, dễ bị bầm tím, hoặc có đốm máu nhỏ dưới da nơi vị trí tiêm.

## Nếu Quý Vị Bị Tác Dụng Phụ

Nếu quý vị bị dị ứng nghiêm trọng, gọi ngay 9-1-1, hoặc đến bệnh viện gần nhất. Gọi nhà cung cấp vắc-xin hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị nếu quý vị bị tác dụng phụ dai dẳng hoặc khiến quý vị lo lắng.

## Các cách Phòng ngừa COVID-19 Khác

Quý vị có quyền quyết định muốn tiêm vắc-xin này hay không, và việc không tiêm loại vắc-xin này sẽ không làm thay đổi dịch vụ chăm sóc y tế đúng theo quy chuẩn dành cho quý vị. Hiện có những loại vắc-xin phòng chống COVID-19 khác.

## Để Biết Thêm Thông Tin

Truy cập [www.janssencovid19vaccine.com](http://www.janssencovid19vaccine.com) hoặc [www.cdc.gov/coronavirus](http://www.cdc.gov/coronavirus)

Gọi số 1-800-565-4008 hoặc (908) 455-9922



Theo [Trang Thông Tin dành cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Y Tế và Đối Tượng Nhận Dịch Vụ Y Tế của FDA](#)