

# 情况说明书： 强生 COVID-19 疫苗风险与益处

了解接受单剂量强生 COVID-19 疫苗的风险与益处，可能会帮助您预防感染 COVID-19。您可自行选择是否要接种这种疫苗。如有疑问，请与疫苗接种提供者联系。

## 关于这种疫苗

这是一种未经批准的疫苗，目前仍在临床试验中进行研究。美国食品药品监督管理局 (FDA) 已授权其紧急使用，以帮助年满 18 岁者预防感染 COVID-19。这种疫苗单剂量注射到肌肉中。像所有 COVID-19 疫苗一样，这种疫苗尚未获得美国食品药品监督管理局 (FDA) 的正式批准，但是，鉴于 COVID-19 疫情大流行的严重性，已获授权紧急使用。这种疫苗单剂量注射到肌肉中。像所有 COVID-19 疫苗一样，鉴于 COVID-19 疫情大流行的严重性，这种疫苗已获美国食品药品监督管理局 (FDA) 授权紧急使用。这种疫苗单剂量注射到肌肉中。

## 接种疫苗之前

应该告诉疫苗接种提供者自己的所有病况，包括：

- 任何过敏
- 发烧
- 患有出血性疾病或在使用血液稀释剂
- 免疫力低下或在服用会影响免疫系统的药物
- 怀孕、哺乳或计划怀孕
- 已经接种另一种 COVID-19 疫苗

## 如有以下情况下，则不应接种这种疫苗：

对这种疫苗的任何成分有严重的过敏反应：表达 SARS-CoV-2 刺突蛋白的重组无复制能力的 26 型腺病毒、柠檬酸一水合物、柠檬酸三钠二水合物、乙醇、2-羟丙基-β-环糊精 (HBCD)、聚山梨酯-80 和氯化钠。

## 这种疫苗的益处

在一项正在进行的临床试验中，已证明单剂注射这种疫苗后能预防 COVID-19 引起的疾病、住院或死亡。目前尚不知道预防 COVID-19 的有效期限是多久。

## 与这种疫苗相关的风险

- **一般副作用：**这种疫苗报告的副作用包括注射部位反应和头痛、感到非常疲倦、肌肉酸痛、恶心和发烧。
- **严重过敏反应：**疫苗极不可能引起严重的过敏反应（呼吸困难、面部和喉咙肿胀、心跳加快、全身皮疹、头晕、虚弱），通常在接种后几分钟至一小时内发生。
- **血凝块：**某些接种了强生 (Johnson & Johnson) COVID-19 疫苗的人中出现了涉及脑部、腹部和腿部血管的血凝块及血小板含量低（帮助人体止血的血液细胞）。在出现血凝块的人中，症状在接种疫苗后约 1-2 周开始出现，且大多数是未满 50 岁的女性。接种疫苗几天后，如有以下任何症状，应立即就医：呼吸急促、胸口疼痛、腿部肿胀、持续腹痛、严重头痛、视力模糊、容易瘀伤或注射部位外的皮肤下容易出现瘀伤或小血斑。

## 如果遇到副作用

如果遇到严重的过敏反应，请致电 9-1-1 或去最近的医院。如有任何不适或不消失的副作用，请致电疫苗接种提供者或医疗服务提供者。

## 其他预防 COVID-19 的选择

您可自行选择是否要接种这种疫苗，不接种这种疫苗不会改变您的标准医疗护理。还可接种其他疫苗来预防 COVID-19。

## 更多信息

请访问 [www.janssencovid19vaccine.com](http://www.janssencovid19vaccine.com)  
或 [www.cdc.gov/coronavirus](http://www.cdc.gov/coronavirus)

请致电 1-800-565-4008 或 (908) 455-9922



改编自美国食品药品监督管理局 (FDA) 接受者和照顾者情况说明书