

# 情況說明書： 強生 COVID-19 疫苗風險與益處

了解接受單劑量強生 COVID-19 疫苗的風險與益處，可能會幫助您預防感染 COVID-19。您可自行選擇是否要接種這種疫苗。如有疑問，請與疫苗接種提供者聯絡。

## 關於這種疫苗

這是一種未經批准的疫苗，目前仍在臨床試驗中進行研究。美國食品藥品監督管理局 (FDA) 已授權其緊急使用，以幫助年滿 18 歲者預防感染 COVID-19。這種疫苗單劑量注射到肌肉中。像所有 COVID-19 疫苗一樣，這種疫苗尚未獲得美國食品藥品監督管理局 (FDA) 的正式批准，但是，鑒於 COVID-19 疫情大流行的嚴重性，已獲授權緊急使用。這種疫苗單劑量注射到肌肉中。像所有 COVID-19 疫苗一樣，鑒於 COVID-19 疫情大流行的嚴重性，這種疫苗已獲美國食品藥品監督管理局 (FDA) 授權緊急使用。這種疫苗單劑量注射到肌肉中。

## 接種疫苗之前

應該告訴疫苗接種提供者自己的所有病況，包括：

- 任何過敏
- 發燒
- 患有出血性疾病或在使用血液稀釋劑
- 免疫力低下或在服用會影響免疫系統的藥物
- 懷孕、哺乳或計劃懷孕
- 已經接種另一種 COVID-19 疫苗

## 如有以下情況下，則不應接種這種疫苗：

對這種疫苗的任何成分有嚴重的過敏反應：表達 SARS-CoV-2 刺突蛋白的重組無複製能力的 26 型腺病毒、檸檬酸一水合物、檸檬酸三鈉二水合物、乙醇、2-羥丙基-β-環糊精 (HBCD)、聚山梨酯-80 和氯化鈉。

## 這種疫苗的益處

在一項正在進行的臨床試驗中，已證明單劑注射這種疫苗後能預防 COVID-19 引起的疾病、住院或死亡。目前尚不知道預防 COVID-19 的有效期限是多久。

## 與這種疫苗相關的風險

- **一般副作用：**這種疫苗報告的副作用包括注射部位反應和頭痛、感到非常疲倦、肌肉酸痛、噁心和發燒。
- **嚴重過敏反應：**疫苗極不可能引起嚴重的過敏反應 (呼吸困難、面部和喉嚨腫脹、心跳加快、全身皮疹、頭暈、虛弱)，通常在接種後幾分鐘至一小時內發生。
- **血凝塊：**某些接種了強生 (Johnson & Johnson) COVID-19 疫苗的人中出現了涉及腦部、腹部和腿部血管的血凝塊及血小板含量低 (幫助人體止血的血液細胞)。在出現血凝塊的人中，症狀在接種疫苗後約 1-2 週開始出現，且大多數是未滿 50 歲的女性。接種疫苗幾天後，如有以下任何症狀，應立即就醫：呼吸急促、胸口疼痛、腿部腫脹、持續腹痛、嚴重頭痛、視力模糊、容易瘀傷或注射部位外的皮膚下容易出現瘀傷或小白斑。

## 如果遇到副作用

如果遇到嚴重的過敏反應，請致電 9-1-1 或去最近的醫院。如有任何不適或不消失的副作用，請致電疫苗接種提供者或醫療服務提供者。

## 其他預防 COVID-19 的選擇

您可自行選擇是否要接種這種疫苗，不接種這種疫苗不會改變您的標準醫療照護。還可接種其他疫苗來預防 COVID-19。

## 更多資訊

請造訪 [www.janssencovid19vaccine.com](http://www.janssencovid19vaccine.com)  
或 [www.cdc.gov/coronavirus](http://www.cdc.gov/coronavirus)

請致電 1-800-565-4008 或 (908) 455-9922



改編自美國食品藥品監督管理局 (FDA) 接受者和照顧者  
情況說明書