

情况说明书：莫德纳新冠病毒 (COVID-19) 疫苗 益处与风险



了解接受两剂莫德纳新冠病毒 (COVID-19) 疫苗的益处与风险, 可能有助于预防感染新冠病毒 (COVID-19)。可自行选择是否要接种这种疫苗。如有疑问, 请与疫苗接种提供者联系。

关于这种疫苗

与所有新冠病毒 (COVID-19) 疫苗一样, 鉴于新冠病毒 (COVID-19) 疫情大流行的严重性, 这种疫苗已获美国食品药品监督管理局 (FDA) 授权紧急使用。莫德纳疫苗已获得紧急使用授权, 凡年满 18 岁者皆可接种。这种疫苗是两剂系列, 间隔一个月时间注射到肌肉中。

这种疫苗的益处

已经证明, 在间隔一个月注射这种疫苗后能预防新冠病毒 (COVID-19) 引起的疾病、住院或死亡。

接种疫苗后的副作用

这种疫苗报告的一般副作用包括注射部位反应和头痛、感到非常疲倦、肌肉酸痛、恶心和发烧。

与这种疫苗相关的风险

接种新冠病毒 (COVID-19) 疫苗的风险很小, 但接种疫苗的益处切大于风险。

- **严重过敏反应:** 疫苗极不可能引起严重的过敏反应 (呼吸困难、面部和喉咙肿胀、心跳加快、全身皮疹、头晕、虚弱), 通常在接种后几分钟至一小时内发生。如果出现严重的过敏反应, 请拨打 9-1-1。
- **心肌炎和心包炎:** 莫德纳新冠病毒 (COVID-19) 疫苗接种后出现过罕见的心肌炎和心包炎病例, 尤其是在男性青少年和年轻成人中, 在接种第二剂后比第一剂更常见, 且通常是在接种后几天内发生。如果出现心肌炎或心包炎的症状, 包括胸痛、呼吸急促及心跳加快、颤动或心跳加速的感觉, 即应就医。

如果遇到副作用

如果遇到严重的过敏反应, 请拨打 9-1-1 或去最近的医院。如有任何不适或不消失的副作用, 请致电疫苗接种提供者或医疗服务提供者。

疫苗接种选择

可自行选择是否要接种这种疫苗。还可接种其他疫苗来预防新冠病毒 (COVID-19)。

更多信息

[莫德纳新冠病毒 \(COVID-19\) 疫苗](#), [疾病控制与预防中心 \(CDC\): 新冠病毒](#)、[了解信使核糖核酸 \(mRNA\) 新冠病毒 \(COVID-19\) 疫苗](#)、[莫德纳新冠病毒 \(COVID-19\) 疫苗概述和安全性](#), 或致电 1-866-663-3762

