

팩트 시트: Pfizer 코로나19 백신 이점 및 위험



코로나19를 예방할 수 있는 화이자 코로나19 백신 2회 투여의 이점과 위험을 알아 두십시오. 이 백신을 맞는 것은 개인의 선택입니다. 질문이 있는 경우 예방 접종 제공자에게 문의하세요.

이 백신에 대한 사실 정보

이 백신은 16세 이상을 대상으로 FDA의 정식 승인을 받았습니다. 이 백신은 12 - 15세를 대상으로 FDA 긴급 사용 승인을 받았습니다. 이 백신은 3 주 간격으로 근육에 주사하는 2회 투여용입니다.

이 백신의 이점

이 백신은 3주 간격으로 2회 투여한 후 코로나19로 인한 질병, 입원 또는 사망을 예방하는 것으로 나타났습니다.

백신 접종 후 나타날 수 있는 증상

이 백신 접종과 관련하여 보고된 일반적인 부작용으로는 주사 부위의 반응 및 두통, 매우 피곤한 느낌, 근육통, 메스꺼움 및 발열이 있습니다.

이 백신과 관련된 위험

코로나19 백신 접종을 받으면 약간의 위험이 있지만 예방 접종의 이점이 아래와 같은 위험보다 큼니다:

- **심한 알레르기 반응:** 일반적으로 백신 접종 후 몇 분 또는 한 시간 후에 나타나는 심한 알레르기 반응 (호흡 곤란, 얼굴 및 목의 부기, 빠른 심장 박동, 전신의 심한 발진, 현기증, 무력감)을 일으킬 가능성이 약간 있습니다. 심한 알레르기 반응이 나타나면, 9-1-1에 전화하세요.
- **심근염 및 심낭염:** 화이자 코로나19 백신 1차 접종 때보다는 2차 접종 후 며칠 내에 특히 청소년과 젊은 성인에서 심근염 (myocarditis) 및 심낭염 (pericarditis)이 드물게 발생했습니다. 가슴 통증, 숨가쁨, 심장이 빠르게 뛰거나, 팔딱거리거나 두근거리는 느낌을 포함하여 심근염이나 심낭염의 증상이 나타나면 의사의 진료를 받아야 합니다.

부작용을 경험하는 경우

심한 알레르기 반응이 나타나면 9-1-1에 전화하거나 가까운 병원으로 가세요. 괴롭히거나 사라지지 않는 부작용이 있으면 예방 접종 제공자 또는 담당 의료 서비스 제공자에게 연락하세요.

예방 접종 옵션

이 백신을 맞는 것은 개인의 선택입니다. 코로나19를 예방하는 다른 백신도 있습니다.

추가 정보

[화이자: 코로나19 백신 개발 노력](#), [코로나19 백신](#), [화이자 바이오엔텍 백신 개요 및 안정성](#), [mRNA 코로나19 백신 이해하기를 참조하거나 1-800-438-1985에 전화하세요.](#)

