



了解接受两剂辉瑞新冠病毒 (COVID-19) 疫苗的益处与风险,可能有助于预防感染新冠病毒 (COVID-19)。可自行选择是否要接种这种疫苗。如有疑问,请与疫苗接种提供者联系。

关于这种疫苗

这种疫苗现已获得美国食品药品监督管理局 (FDA) 的完全批准,凡年满 16 岁者皆可接种,而 12 至 15 岁者也可根据美国食品药品监督管理局 (FDA) 紧急使用授权接种。疫苗是两剂系列,间隔三周时间注射到肌肉中。

这种疫苗的益处

已经证明,在间隔三周注射这种疫苗后能预防新冠病毒 (COVID-19) 引起的疾病、住院或死亡。

接种疫苗后的副作用

这种疫苗报告的一般副作用包括注射部位反应和头痛、感到非常疲倦、肌肉酸痛、恶心和发烧。

与这种疫苗相关的风险

接种新冠病毒 (COVID-19) 疫苗的风险很小,但接种疫苗的益处切大于风险:

- 严重过敏反应:疫苗极不可能引起严重的过敏反应(呼吸困难、面部和喉咙肿胀、心跳加快、全身皮疹、头晕、虚弱),通常在接种后几分钟至一小时内发生。如果出现严重的过敏反应,请拨打 9-1-1。
- 心肌炎和心包炎:辉瑞新冠病毒 (COVID-19) 疫苗接种后出现过罕见的心肌炎和心包炎病例,尤其是在男性青少年和年轻成人中,在接种第二剂后比第一剂更常见,且通常是在接种后几天内发生。如果出现心肌炎或心包炎的症状,包括胸痛、呼吸急促及心跳加快、颤动或心跳加速的感觉,即应就医。

如果遇到副作用

如果遇到严重的过敏反应,请拨打 9-1-1 或去最近的医院。如有任何不适或不消失的副作用,请致电疫苗接种提供者或医疗服务提供者。

疫苗接种选择

可自行选择是否要接种这种疫苗。还可接种其他疫苗来预防新冠病毒 (COVID-19)。

更多信息

[辉瑞:新冠病毒 \(COVID-19\) 疫苗工作](#)、[新冠病毒 \(COVID-19\) 疫苗](#)、[辉瑞疫苗概述和安全性](#)、[了解信使核糖核酸 \(mRNA\) 新冠病毒 \(COVID-19\) 疫苗](#),或致电 1-800-438-1985。

