

輝瑞新冠病毒 (COVID-19) 疫苗益處與風險

了解接受兩劑輝瑞新冠病毒 (COVID-19) 疫苗的益處與風險，可能有助於預防感染新冠病毒 (COVID-19)。可自行選擇是否要接種這種疫苗。如有疑問，請與疫苗接種提供者聯絡。

關於這種疫苗

這種疫苗現已獲得美國食品藥品監督管理局 (FDA) 的完全批准，凡年滿 16 歲者皆可接種，而 12 至 15 歲者也可根據美國食品藥品監督管理局 (FDA) 緊急使用授權接種。疫苗是兩劑系列，間隔三週時間注射到肌肉中。

這種疫苗的益處

已經證明，在間隔三週注射這種疫苗後能預防新冠病毒 (COVID-19) 引起的疾病、住院或死亡。

接種疫苗後的副作用

這種疫苗報告的一般副作用包括注射部位反應和頭痛、感到非常疲倦、肌肉酸痛、噁心和發燒。

與這種疫苗相關的風險

接種新冠病毒 (COVID-19) 疫苗的風險很小，但接種疫苗的益處切大於風險：

- 嚴重過敏反應：疫苗極不可能引起嚴重的過敏反應（呼吸困難、面部和喉嚨腫脹、心跳加快、全身皮疹、頭暈、虛弱），通常在接種後幾分鐘至一小時內發生。如果出現嚴重的過敏反應，請撥打 9-1-1。
- 心肌炎和心包膜炎：輝瑞新冠病毒 (COVID-19) 疫苗接種後出現過罕見的心肌炎和心包膜炎病例，尤其是在男性青少年和年輕成人中，在接種第二劑後比第一劑更常見，且通常是在接種後幾天內發生。如果出現心肌炎或心包膜炎的症狀，包括胸痛、呼吸急促及心跳加快、顫動或心跳加速的感覺，即應就醫。

如果遇到副作用

如果遇到嚴重的過敏反應，請撥打 9-1-1 或去最近的醫院。如有任何不適或不消失的副作用，請致電疫苗接種提供者或醫療服務提供者。

疫苗接種選擇

可自行選擇是否要接種這種疫苗。還可接種其他疫苗來預防新冠病毒 (COVID-19)。

更多資訊

[輝瑞：新冠病毒 \(COVID-19\) 疫苗工作](#)、[新冠病毒 \(COVID-19\) 疫苗](#)、[輝瑞疫苗概述和安全性](#)、[了解信使核糖核酸 \(mRNA\) 新冠病毒 \(COVID-19\) 疫苗](#)，或致電 1-800-438-1985。

