

إجراء فحص كوفيد-19 – ما تحتاج إلى معرفته



متى ينبغي أن تخضع للفحص؟

إذا شعرت بالمرض وظهرت عليك أعراض كوفيد-19

- افحص فوراً. إذا كانت نتيجة فحصك الأول سلبية، افحص مرة أخرى بعد مرور يوم - يومين.

بعد تعرّضك

- حتى لو لم تكن تشعر بالمرض، قم بالفحص عندما تكتشف ذلك، وبعد مرور 3-5 أيام على تعرّضك.

بعد السفر

- من الممكن أن تكون قد تعرّضت بعد أن استخدمت وسيلة نقل عامة، أو كنت في مكان مزدحم. افحص بعد مرور 3-5 أيام على عودتك.

التجمعات الكبيرة

- افحص قبل حضور تجمعات كبيرة في أماكن داخلية أو زيارة أشخاص عرضة لخطر الإصابة بالمرض الشديد (كبار السن أو الأشخاص من ذوي المناعة الضعيفة). احرص على الفحص مرة أخرى بعد مرور 3-5 أيام على التجمع أو الفعالية.

نتيجة فحص إيجابية؟

- ابقَ في المنزل. أخبر عمالك أو مدرستك، واتبع التوجيه الخاص بهم وأيضاً [توصيات العزل الخاصة بكوفيد-19](#)، للوقاية من نقل الفيروس إلى الآخرين.
- الأعمار 12 عامًا أو أكبر؟ احصل على [أدوية مجانية لعلاج كوفيد-19](#)، حيث تكون آمنة وذات فعالية عالية في الوقاية من المرض الشديد، عند تناولها في غضون 5-7 أيام من ظهور الأعراض.

نتيجة فحص سلبية، ولا زالت لديك أعراض كوفيد-19؟

- ارتد كمامة. انتشر في عمالك أو مدرستك للمزيد من التوجيه.
- افحص مرة أخرى خلال يوم - يومين.

تحتاج إلى المزيد من الفحوصات؟

- قد يكون باستطاعتك الحصول على [فحوصات مجانية](#) ضمن التأمين الطبي المتاح في متجر بيع الأدوية بمنطقتك (داخل المتجر أو عبر الإنترنت).
- اشتر من متجر بيع الأدوية أو الصيدلية بمنطقتك (داخل المتجر أو عبر الإنترنت).
- تحديث بشأن انتهاء صلاحية: معظم مجموعات الفحص المنزلي تسري عليها [تمديدات FDA لفترة الصلاحية](#)، ويمكن استخدامها لمدة تتجاوز التواريخ المطبوعة على العبوات الخارجية.

أين يمكن إجراء الفحص أيضاً؟

- قم بزيارة [MyTurn](#)، أو إذا لم يكن لديك تأمين صحي، ابحث عبر الإنترنت عن [مواقع تقديم فحوصات مجانية](#)، أو عبر الاتصال بالرقم 422-4255 (833) أو 211.



امسح رمز QR، للاطلاع على الروابط التفاعلية في هذا المنشور

