


# Eligiendo la Vacuna Contra el COVID-19 Correcta para Usted



La fda ha autorizado tres vacunas contra el COVID-19 para uso de emergencia dada la gravedad de la pandemia. Comprenda los beneficios y riesgos que le ayudarán a decidir cual vacuna es la correcta para usted.

## COVID-19 Puede Causar Enfermedades Graves

COVID-19 es causada por un coronavirus que se propaga en el aire, especialmente cuando una persona infectada habla, estornuda o tose en interiores. COVID-19 puede causar enfermedades graves, neumonía y la muerte y todavía estamos aprendiendo sobre sus efectos a largo plazo.

## Se Recomienda la Vacunación para Personas Mayores de 12 Años

La CDC recomienda que todas las personas mayores de 12 años reciban la vacuna contra el COVID-19. En este momento, los jóvenes entre 12 y 15 años pueden recibir la vacuna Pfizer-BioNTech. Usted decide si quiere vacunarse y puede elegir la vacuna que desea recibir. Sus decisiones no cambiarán su atención médica normal.

## Opciones de Vacunas

Las tres vacunas actualmente autorizadas y recomendadas en los Estados Unidos para prevenir COVID-19 son:

- Pfizer-BioNTech (2 dosis, 21 días entre las dos)
- Moderna (2 dosis, 28 días entre las dos)
- Johnson & Johnson (1 dosis)

## Beneficios de Recibir la Vacuna

Se ha demostrado que todas las vacunas disponibles actualmente son seguras y eficaces para prevenir el COVID-19. La vacunación ayuda a proteger a las personas de enfermarse gravemente de COVID-19 y también podría ayudar a proteger a las personas a su alrededor. Para recibir la mayor protección, las personas deben recibir todas las dosis recomendadas de la vacuna. Vacunar a tantas personas como sea posible nos ayudará a todos a superar esta pandemia.

## Más Información

Si necesita ayuda para programar una cita o tiene preguntas, llame al (833) 422-4255 o visite [www.vaccinateall58.com](http://www.vaccinateall58.com) o [www.cdph.ca.gov](http://www.cdph.ca.gov).

## Riesgos Asociados con la Vacunación

- **Efectos Secundarios Comunes** (Todas las vacunas contra el COVID-19) Unos días después de la vacunación es posible que sienta dolor o inflamación en el lugar de la inyección o dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares, náuseas o fiebre. Estos son signos normales de que su cuerpo está generando protección.
- **Alergias Graves Raras** (Todas las vacunas contra el COVID-19) Raras reacciones alérgicas pueden ocurrir dentro de unos minutos a una hora después de recibir una dosis, incluyendo sarpullido con picazón o urticaria, dificultad para respirar o tragar, inflamación de la cara o garganta, mareos, malestar estomacal o pulso acelerado.
- **Coágulos de Sangre Raros** (La vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson) En las primeras semanas después de la vacunación de Johnson & Johnson, unas cuantas personas han desarrollado coágulos de sangre muy raros. Estos son coágulos de vasos sanguíneos en el cerebro, el abdomen o las piernas, junto con niveles bajos de células que detienen el sangrado y pueden provocar una enfermedad grave o la muerte. La mayoría de personas que han desarrollado estos coágulos de sangre han sido mujeres menores de 50 años. Sus síntomas comenzaron 1-2 semanas después de la vacunación. Hasta la fecha, estos coágulos de sangre raros no se han observado después de las vacunas Pfizer o Moderna.

## Buscando Atención Médica

Busque atención médica de inmediato o llame al 9-1-1 si tiene síntomas graves después de la vacunación, como dificultad para respirar, dolor en el pecho, inflamación en las piernas, dolor abdominal persistente, dolores de cabeza intensos, visión borrosa, muchos moretones o pequeñas manchas de sangre debajo de la piel. Llame a su proveedor de vacunas o proveedor de atención médica si tiene algún síntoma que le moleste o que no desaparezca después de algunos días.

