



¿Está embarazada?

Protéjase a usted y a su bebé.

Hable con su proveedor de atención médica sobre las infecciones que pueden afectarle a usted o a su bebé y cómo prevenirlas.

Lo antes posible durante el embarazo

Póngase las vacunas actualizadas contra la influenza (gripe) y el COVID-19.



1. En la primera cita prenatal

Hágase la prueba de:

- VIH
- sífilis
- hepatitis B y hepatitis C
- gonorrea y clamidia
- tuberculosis (si es de alto riesgo)
- inmunidad a la rubéola
- inmunidad a la varicela (si nunca se vacunó ni tuvo la enfermedad)



2. En el tercer trimestre (27 a 40 semanas)

- Vacúnese contra la tosferina (Tdap) durante cada embarazo (entre las 27 y 36 semanas).
- Vacúnese contra el VRS de septiembre a enero (entre las 32 y 36 semanas).
- Vuelva a hacerse la prueba de la sífilis (a la semana 28) y hágase la prueba del estreptococo del grupo B (entre las 36 y 38 semanas).
- Pregúntele a su proveedor si debe hacerse la prueba de la hepatitis C, el VIH, la gonorrea o la clamidia (antes de las 36 semanas).



3. En el parto

- Vuelva a hacerse la prueba de la sífilis.
- Pregúntele a su proveedor de atención médica si debe hacerse la prueba del VIH, hepatitis B o hepatitis C en el momento del parto.
- Si padece de VIH, sífilis, hepatitis B o hepatitis C, hable con su proveedor de atención médica para que le hagan la prueba a su bebé.