

دليل الوالدين للتحصينات

المطلوبة لمرحلة ما قبل روضة الأطفال (رعاية الطفل)

يجب على الوالدين إظهار بطاقة التحصين الخاصة بطفلهم كدليل على التحصينات (الحقن) قبل بدء مرحلة ما قبل روضة الأطفال (رعاية الطفل) وعند كل فحص في كل عمر بعد دخول المدرسة:

الجرعات المطلوبة	العمر عند دخول المدرسة/الفحص
1 شلل الأطفال 1 التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي 1 التهاب الكبد الوبائي B 1 المستدمية النزلية من النوع ب	2 - 3 شهر
2 شلل الأطفال 2 التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي 2 التهاب الكبد الوبائي B 2 المستدمية النزلية من النوع ب	4 - 5 شهر
2 شلل الأطفال 3 التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي 2 التهاب الكبد الوبائي B 2 المستدمية النزلية من النوع ب	6 - 14 شهر
3 شلل الأطفال 3 التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي 2 التهاب الكبد الوبائي B 1 المستدمية النزلية* (عند إتمام العام الأول بعد الميلاد أو بعد ذلك) 1 الجدري المائي 1 الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية (عند إتمام العام الأول بعد الميلاد أو بعد ذلك)	15 - 17 شهر
3 شلل الأطفال 4 التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي 3 التهاب الكبد الوبائي B 1 المستدمية النزلية* (عند إتمام العام الأول بعد الميلاد أو بعد ذلك) 1 الجدري المائي 1 الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية (عند إتمام العام الأول بعد الميلاد أو بعد ذلك)	من عمر 18 شهرًا - 5 أعوام

* يجب إعطاء جرعة واحدة من لقاح المستدمية النزلية عند إتمام العام الأول بعد الميلاد أو بعد ذلك بغض النظر عن الجرعات السابقة. مطلوب فقط للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام.

شنيل للأطفال = لقاح الالتهاب الكبدي الوبائي B
 لقاح جدري الماء = Varicella
 لقاح Hib = لقاح المستدمية النزلية، النوع ب
 لقاح MMR = لقاح الحصبة، والنكاف، و الحصبة الألمانية

شنيل للأطفال = لقاح شنيل للأطفال المعطل [IPV] لا يتم احتساب لقاح شلل الأطفال الفموي [OPV]
 DTaP = ذوفان الخناق، ذوفان الكزان، ولقاح السعال الديكي الخلوي