

ការណែនាំមាតាបិតាអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺ
តម្រូវឱ្យមានស្រមាប់កុមារមុនចូលរៀនសាលាមត្តេយ្យ (ថែទាំសុខភាពកុមារ)



មាតាបិតាត្រូវបង្ហាញកំណត់ត្រាចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកូនរបស់ពួកគេ ជាឯកសារបញ្ជាក់អំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺ (ការចាក់ថ្នាំ) មុនពេលចាប់ផ្តើមចូលរៀនសាលាមត្តេយ្យ (ការថែទាំសុខភាពកុមារ) និងការពិនិត្យមើលតាមអាយុនីមួយៗក្រោយពីចូលរៀន៖

អាយុនៅពេលចូលរៀន/ ការពិនិត្យមើល	កម្រិតថ្នាំដែលត្រូវការ
2-3 ខែ	1 ប៉ូស៊ីយោ 1 DTaP 1 Hep B 1 Hib
4-5 ខែ	2 ប៉ូស៊ីយោ 2 DTaP 2 Hep B 2 Hib
6-14 ខែ	2 ប៉ូស៊ីយោ 3 DTaP 2 Hep B 2 Hib
15-17 ខែ	3 ប៉ូស៊ីយោ 3 DTaP 2 Hep B 1 Hib* (នៅថ្ងៃខួបកំណើតទី 1 ឬបន្ទាប់ពីនោះ) 1 Varicella 1 MMR (នៅថ្ងៃខួបកំណើតទី 1 ឬបន្ទាប់ពីនោះ)
18 ខែ-5 ឆ្នាំ	3 ប៉ូស៊ីយោ 4 DTaP 3 Hep B 1 Hib* (នៅថ្ងៃខួបកំណើតទី 1 ឬបន្ទាប់ពីនោះ) 1 Varicella 1 MMR (នៅថ្ងៃខួបកំណើតទី 1 ឬបន្ទាប់ពីនោះ)

* កម្រិតថ្នាំ Hib មួយដូសនៅថ្ងៃ ឬក្រោយថ្ងៃកំណើតទី 1 ដោយមិនគិតកម្រិតថ្នាំពីមុនឡើយ។ តម្រូវឱ្យមានសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុក្រោម 5 ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ។

ប៉ូស៊ីយោ = វ៉ាក់សាំងប៉ូស៊ីយោ អសកម្ម (IPV)
 (វ៉ាក់សាំងលេបតាមមាត់ [OPV] មិនរាប់បញ្ចូលនោះទេ)
 DTaP = វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺខាន់ស្លាក់ (diphtheria toxoid)
តេតាណុស (tetanus toxoid) និងក្អកមាត់ (acellular pertussis)

Hep B = វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺមេរោគប្រភេទបេ (hepatitis B)
 Varicella = វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺអុតស្វាយ (chickenpox)
 Hib = វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺគ្រុនផ្តាសាយប្រភេទបេ
 (Haemophilus influenzae, type B)
 MMR = វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកញ្ជើស (measles) ក្រព្យុន (mumps) និងជំងឺកញ្ជើសស្រាល (rubella)