

والدین باید سوابق تزریق واکسن کودک خود را به عنوان مدرکی مبنی بر واکسیناسیون (واکسن‌های) قبل از شروع پیش مهدکودک (مراقبت از کودک) و در هر موعد بررسی سنی پس از ورود نشان دهند:

| سن در حین ورود / موعد بررسی | دوزهای الزامی |
|-----------------------------|---|
| 3-2 ماهگی | 1 فلج اطفال DTaP 1 1 هپ B Hib 1 |
| 4-5 ماهگی | 2 فلج اطفال DTaP 2 2 هپ B Hib 2 |
| 6-14 ماهگی | 2 فلج اطفال DTaP 3 2 هپ B Hib 2 |
| 15-17 ماهگی | 3 فلج اطفال DTaP 3 2 هپ B Hib 1* (همزمان با یا بعد از تولد 1 سالگی) 1 واریسلا MMR 1 (همزمان با یا بعد از تولد 1 سالگی) |
| 18 ماهگی تا 5 سالگی | 3 فلج اطفال DTaP 4 3 هپ B Hib 1* (همزمان با یا بعد از تولد 1 سالگی) 1 واریسلا MMR 1 (همزمان با یا بعد از تولد 1 سالگی) |

* یک دوز Hib باید همزمان با یا بعد از تولد یک سالگی بدون توجه به دوزهای قبلی تزریق شود. فقط برای کودکان کمتر از 5 سال الزامی است.

واریسلا = واکسن آبله‌مرغان
 Hib = واکسن آنفلوآنزای هموفیلوس، نوع B
 MMR = واکسن سرخک، اوریون و سرخچه

فلج اطفال = واکسن فلج اطفال غیرفعال (IPV)
 (واکسن خوراکی فلج اطفال [OPV] به حساب نمی‌آید)
 DTaP = توکسوئید دپتری، توکسوئید کزاز،
 و واکسن بدون سلول سپیاسرفه
 هپ B = واکسن هیپاتیت B