

# РУКОВОДСТВО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ВАКЦИНАЦИИ, ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЕ (УЧРЕЖДЕНИЯ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ)



Перед началом обучения в дошкольной группе (учреждения по уходу за детьми) и после поступления в такое учреждение при достижении ребенком определенного возраста родители обязаны предъявлять карту прививок ребенка для подтверждения вакцинации.

Возраст при поступлении или определенный возраст	Обязательные прививки
2–3 месяца	<b>1 прививка от полиомиелита</b> <b>1 прививка DTaP</b> <b>1 прививка Hep B</b> <b>2 прививки Hib</b>
4–5 месяцев	<b>2 прививка от полиомиелита</b> <b>2 прививки DTaP</b> <b>2 прививки Hep B</b> <b>2 прививки Hib</b>
6–14 месяцев	<b>2 прививки от полиомиелита</b> <b>3 прививки DTaP</b> <b>2 прививки Hep B</b> <b>2 прививки Hib</b>
15–17 месяцев	<b>3 прививки от полиомиелита</b> <b>3 прививки DTaP</b> <b>2 прививки Hep B</b> <b>1 прививка Hib* (не ранее 1-го дня рождения)</b> <b>1 прививка от ветряной оспы</b> <b>1 прививка MMR (не ранее 1-го дня рождения)</b>
18 месяцев – 5 лет	<b>3 прививки от полиомиелита</b> <b>4 прививки DTaP</b> <b>3 прививки Hep B</b> <b>1 прививка Hib* (не ранее 1-го дня рождения)</b> <b>1 прививка от ветряной оспы</b> <b>1 прививка MMR (не ранее 1-го дня рождения)</b>

\* Одна прививка Hib должна быть сделана в 1-й день рождения или позже независимо от того, вводилась ли вакцина раньше. Обязательно только для детей младше 5 лет.

Полиомиелит = [полиомиелитная инактивированная вакцина \(ИПВ\)](#) [пероральная полиомиелитная вакцина (ОПВ) не учитывается]  
DTaP = [анатоксин дифтерии, анатоксин столбняка](#) и бесклеточная [коклюшная](#) вакцина

Hep B = [вакцина против гепатита B](#)  
Ветряная оспа = вакцина против [ветрянки](#)  
Hib = вакцина против [гемофильной инфекции типа B](#)  
MMR = вакцина против [кори, свинки и краснухи](#)