

尊敬的家長及監護人：

謹以此函通知，您的子女可能已在我校接觸到百日咳桿菌。

百日咳，又名疫咳，是一種傳染性極強的細菌感染。它可以通過近距離接觸傳播，伴有咳嗽症狀。一般感染後 5 至 21 天會出現症狀。剛開始就像普通感冒（如：打噴嚏、流鼻涕等）一樣，然後咳嗽會越來越嚴重，維持一至兩周。患有百日咳的人會一陣陣地咳嗽和呼吸困難。有些人可能需要大口喘氣（「喘息」），並伴有嘔吐或窒息的感覺。百日咳患者通常不會發燒。

沒有接種百日咳疫苗（DTaP）的年幼兒童患百日咳的風險更高。建議 2、4、6 歲和 15-18 個月大的幼兒接種 DTaP。4-6 歲的幼稚園適齡兒童和 11-12 歲的中學生均應接種 DTaP。我們強烈要求您確保自己的孩子已經接種了所有推薦的 DTaP，請檢查免疫接種記錄或聯繫孩子的衛生保健提供者。

一般情況下，接種一系列百日咳疫苗或加強劑量疫苗可有效地預防此病或降低疾病的嚴重程度。但是一段時間以後，人們對百日咳的免疫能力會很快地消退。所以，即使是接種了所有疫苗的人和兒童也有可能染上百日咳。

建議所有成人，尤其是孕婦（在每次懷孕期間）和嬰兒護理者均需接種加強劑量疫苗（Tdap）。如果您或您家中年長的孩子尚未接種 Tdap，請立即付諸行動。醫生辦公室（學生健康中心，如適用）、一些藥房和地方衛生部門均可接種 Tdap，並且接種此疫苗通常包含在保險計畫內。

如果您的孩子有感冒症狀和咳嗽，請聯繫醫生。告訴醫生，您的孩子所在的學校已經有一名百日咳確診病例。診斷百日咳最為準確的測試方式就是用一個鼻拭子採集樣本。如果您的孩子已經看過醫生並被確診為患有百日咳，請讓孩子待在家中，直到度過規定的 5 天抗生素治療期。

地方衛生部門會繼續調查有關情況。如果您或您的醫生有任何疑問，請使用以下聯繫資訊。

誠摯問候！