

Уважаемые родители и опекуны:

В этом письме сообщаем, что ваш ребенок мог заразиться коклюшем в школе.

Спазматический кашель или коклюш — это чрезвычайно заразная бактериальная инфекция, которая распространяется при тесном контакте с кашляющим больным. Симптомы заболевания могут проявиться в течение 5–21 дня после заражения. Заболевание начинается как обычная простуда (чиханье, насморк и т. п.), потом появляется кашель, который усиливается в течение одной-двух недель. У больных коклюшем могут быть сильные приступы кашля, во время которых им трудно дышать. У некоторых наблюдаются громкие и спазматические вздохи, рвота или чувство удушья. Температура при коклюше обычно не повышается.

Маленькие дети, не завершившие курс вакцинации DTap, находятся в группе повышенного риска серьезных осложнений заболевания. Сделать прививку от коклюша (DTaP) рекомендуется детям в возрасте 2, 4, 6 и 15–18 месяцев. Перед началом посещения детского сада дети в возрасте 4–6 лет также получают стимулирующую дозу вакцины DTap; учащимся средней школы в возрасте 11–12 лет рекомендуется получить стимулирующую дозу вакцины Tdap. Мы призываем вас убедиться в том, что вашему ребенку сделаны все необходимые прививки DTap, проверив его/ее карту вакцинации или связавшись с лечащим врачом.

В целом вакцинация против коклюша очень эффективна, она защищает от заболевания, а в случае заражения ослабляет инфекцию почти сразу после серии прививок или получения стимулирующей дозы вакцины. Однако иммунитет против коклюша быстро ослабевает, поэтому даже те дети, которые прошли полный курс вакцинации, могут заболеть коклюшем.

Получить стимулирующую дозу вакцины (Tdap) также рекомендуется взрослым, особенно беременным женщинам (во время каждой беременности) и тем, кто присматривает за новорожденными детьми. Если вам или вашим детям старшего возраста не делали прививку Tdap, рекомендуется сделать это сейчас. Вакцина Tdap широко доступна во врачебных кабинетах, в некоторых аптеках и учреждениях местных департаментов здравоохранения, и большинство медицинских страховок покрывают ее стоимость.

Если у вашего ребенка появились симптомы простуды и кашель, пожалуйста, обратитесь к врачу. Сообщите врачу, что в школе вашего ребенка уже есть один подтвержденный случай заболевания коклюшем. Наиболее точным методом диагностики коклюша является мазок из носовой полости. **Если после осмотра врачом вашему ребенку был поставлен диагноз коклюш, ребенок обязан находиться дома до окончания 5-дневного курса лечения назначенными антибиотиками.**

Местный департамент здравоохранения продолжит расследование ситуации. Если у вас или вашего лечащего врача возникнут какие-либо вопросы, обращайтесь по указанным ниже контактам.

С уважением,