

부모(보호자)님께

귀하의 자녀가 학교에서 백일해에 노출되었을 가능성이 있음을 알려드리고자 이 통신문을 보내드립니다.

백일해는 이 질병을 앓고 있는 사람이 기침을 할 때 가까이 접촉할 경우 옮을 수 있는 매우 전염성이 강한 박테리아 질병입니다. 증상은 감염 후 5 - 21 일 사이에 나타날 수 있습니다. 초기 증상은 보통 일반 감기와 유사하고(예: 재채기, 콧물 등) 1 - 2 주 내에 기침이 악화됩니다. 백일해에 걸린 사람은 기침할 때 호흡이 곤란한 기침 발작이 일어날 수 있습니다. 어떤 환자는 심하게 숨이 차고 토하거나 숨이 막히는 듯한 증상이 있을 수 있습니다. 보통 백일해는 열이 발생하지 않습니다.

일반적으로 백일해 백신은 질병을 예방하거나 모든 접종 회차 또는 추가 접종 후 바로 그 증상의 정도를 완화하는 효과가 뛰어납니다. 그러나 백신 접종으로 생기는 면역성이 시간이 지나면서 빠르게 약해지므로 모든 회차의 접종을 마친 아동도 백일해에 걸릴 수 있습니다.

11-12 세 중학교 때에 Tdap 추가 접종이 권장되며 캘리포니아 주에서는 7학년 초에 반드시 접종해야 합니다. 성인의 경우, 특히 임신부(임신할 때마다)와 유아를 돌보는 사람은 백신(Tdap)을 추가 접종하는 것이 좋습니다. 귀하 또는 나이가 더 많은 다른 자녀가 Tdap 접종을 하지 않은 경우 바로 꼭 접종하십시오. Tdap 백신은 병원, 일부 약국, 지역 보건 기관에서 보통 구입할 수 있으며 대부분의 건강 보험에서 보장합니다.

자녀가 감기 증상이 있거나 기침을 하는 경우 의사의 진료를 받으십시오. 자녀의 학교에서 백일해 발병이 확인 되었다고 의사에게 알려십시오. **의사가 자녀를 진찰한 후 백일해 진단을 내린 경우 5일간 처방된 항생제 치료를 마칠 때까지 자녀를 집에서 보호하십시오.** 가장 정확한 백일해 진단 방법은 코 분비물 검사입니다.

지역 보건부가 지속적으로 상황을 조사할 것입니다. 부모님 또는 담당 의사가 질문이 있을 경우 다음 연락처 정보를 이용해 문의해주시십시오...

감사합니다.