

학생 여러분께:

교내에 백일해 진단을 받은 사람이 있음을 알려드리고자 이 통신문을 보내드립니다.

백일해는 박테리아에 의한 질병으로 전염성이 매우 강하며 이 질병에 걸린 사람이 기침할 때 가까이 접촉할 경우 전염될 수 있습니다. 감염 후 5 - 21 일 사이에 증상이 나타날 수 있습니다. 초기 증상은 대체로 일반 감기와 유사하고(예: 재채기, 콧물 등). 그 후 기침이 나며 1 - 2 주에 걸쳐 기침이 심해집니다. 백일해에 감염된 사람은 기침할 때 숨을 쉴 수 없을 정도의 발작적 기침을 할 수도 있습니다. 어떤 환자는 숨을 쉴 때 쉼썩 소리가 크게 나고 구토가 나거나 숨이 막히는 것 같습니다. 보통 백일해는 열이 나지 않습니다.

일반적으로 백일해 백신은 백신 접종 또는 추가 접종을 하면바로 질병을 예방하거나 증상을 완화하는 효과가 매우 뛰어납니다. 그러나 백일해 접종 효력은 시간이 지남에 따라 사라지므로 어릴 때 백신 접종을 완전히 마친 사람도 백일해에 걸릴 수 있습니다.

11 살 이상인 모든 사람, 특히 임신부와 유아를 돌보는 사람은 백신을 추가 접종(Tdap)하시기 바랍니다. Tdap 접종을 하지 않은 경우 지금 접종하십시오. Tdap 백신은 일반 병원, 약국, 지역 보건 부서에서 대체로 접종할 수 있으며 대부분의 건강 보험에서 보통 그 비용을 보장합니다.

감기 증상이 있고 기침을 하는 경우 의사에게 진료를 받으십시오. 현재 다니고 있는 [college/university]에서 백일해 확진을 받은 사람이 있다고 의사에게 알려십시오. 백일해 진단을 위한 정확한 검사는 비강 면봉을 사용하여 실시됩니다. 의사가 진료 후 백일해 진단을 내린 경우 처방된 항생제 치료가 진행되는 5 일 동안 등교하지 마십시오.

지역 보건부가 지속적으로 상황을 조사할 것입니다. 귀하 또는 담당 의사에게 질문이 있을 경우 다음 연락처 정보를 이용해 문의해주시십시오.

감사합니다.