

親愛的家長和監護人：

謹以此函通知，您的子女可能已在我校接觸到百日咳桿菌。

百日咳，亦稱頓咳，是一種傳染性很強的細菌性感染，可透過與患者的近距離接觸快速傳播。百日咳的潛伏期為 5~21 天。開始症狀類似于普通感冒（如打噴嚏、流鼻涕等），一到兩周後，咳嗽將加重。感染百日咳的患者可能會陣發性地咳嗽，呼吸不暢。有些患者會氣喘、作嘔或感覺窒息。嬰幼兒感染百日咳後常無典型咳嗽症狀，但會表現為窒息、氣喘、屏氣發紺或作嘔。百日咳通常無發熱症狀。

百日咳疫苗（無細胞百白破疫苗）的最佳接種年齡為 2 歲、4 歲、6 歲和 15-18 個月。4-6 歲的幼兒在進入幼稚園之前可注射一劑無細胞百白破疫苗加強劑；11-12 歲的中學生建議注射一劑破傷風白喉百日咳混合疫苗加強劑。一般情況下，注射疫苗或加強劑後，即可有效預防疾病或減輕病情。但是，接種疫苗後，隨著時間的推移，人體對百日咳的免疫力會很快下降，即便孩子已經全面接種疫苗，仍有可能會患上百日咳。此外，有些孩子尚年幼，還未注射全部疫苗製劑或接受第一次注射，在感染百日咳後非常容易患上嚴重的併發症。強烈建議您檢查貴子女的免疫接種記錄，確保您的子女已注射其年齡段建議接種的所有無細胞百白破疫苗製劑。

成年人建議注射一劑破傷風白喉百日咳混合疫苗加強劑，尤其是孕婦（每次懷孕均應接種）和嬰幼兒看護人員。如果您尚未接種破傷風白喉百日咳混合疫苗，建議您注射一劑該種疫苗。破傷風白喉百日咳混合疫苗在每家醫生診所，部分藥店和地方衛生部門均有出售，大部分保險計畫通常都覆蓋這一項疫苗接種。

如果您的孩子出現類似感冒的症狀，並且不停地咳嗽，請與您的醫生取得聯繫。請告訴醫生，貴子女所在的托兒所已有一例百日咳確診病例。如果您的孩子被醫生診斷出患上百日咳，請讓孩子留在家裏，直到完成規定的 5 天抗生素治療。採用鼻拭子進行百日咳診斷測試所得的結果最為準確。

抗生素可預防百日咳傳播，建議百日咳患者使用抗生素進行治療。與病情很大可能會加重的百日咳患者或高危傳播人群有過接觸的人也應使用抗生素來預防百日咳。接觸者包括不到一歲的嬰兒、孕晚期的孕婦、從事嬰兒或孕婦相關工作的人群。

不到一歲的嬰兒，特別是六個月以下的嬰兒，是最有可能在感染百日咳後出現嚴重病情的群體。嬰兒應盡可能遠離咳嗽人群。出現呼吸不暢或持續咳嗽症狀的嬰兒應立即就醫。

地方衛生部門會繼續調查有關情況。如果您或您的醫生有任何疑問，請使用以下聯繫資訊。

誠摯問候！