

부모(보호자)님께

귀하의 자녀가 저희 시설에서 백일해에 노출되었을 가능성이 있음을 알려드리고자 이 통신문을 보내드립니다.

백일해는 이 질병을 앓고 있는 사람이 기침을 할 때 가까이 접촉할 경우 옮을 수 있는 매우 전염성이 강한 박테리아 질병입니다. 증상은 감염 후 5 - 21 일 사이에 나타날 수 있습니다. 초기 증상은 보통 일반 감기와 유사하고(예: 재채기, 콧물 등) 1 - 2 주 내에 기침이 악화됩니다. 백일해에 걸린 사람은 기침할 때 호흡이 곤란한 기침 발작이 일어날 수 있습니다. 어떤 환자는 심하게 숨이 차고 토하거나 숨이 막히는 듯한 증상이 있을 수 있습니다. 백일해에 걸린 유아는 기침을 하지 않더라도 숨을 쉬기 어렵거나 숨이 차고 붉어지거나 과래지거나 토할 수 있습니다. 보통 백일해는 열이 발생하지 않습니다.

15-18 개월과 2, 4, 6 세 때 백일해 백신 (DTaP) 접종을 하는 것이 좋습니다. 4 -6 세, 유치원 입학 전에 DTaP 추가 접종을 실시하기도 합니다. Tdap 추가 접종은 11-12 세, 중학교 때에 권장됩니다. 일반적으로 백일해 백신은 질병을 예방하거나 모든 접종 회차 또는 추가 접종 후 바로 그 증상의 정도를 완화하는 효과가 뛰어납니다. 그러나 백신 접종으로 생기는 면역성이 시간이 지나면서 빠르게 약해지므로 모든 회차의 접종을 마친 아동도 백일해에 걸릴 수 있습니다. 모든 회차의 DTaP 백신 접종을 마치지 않았거나 1 회차 접종을 한 어린 아동은 심각한 백일해 합병증이 발생할 위험이 있습니다. 그러므로 해당 나이에 권장되는 모든 DTaP 접종을 하였는지 자녀의 예방 접종 기록을 꼭 확인하시기 바랍니다.

성인의 경우, 특히 임신부(임신할 때마다)와 유아를 돌보는 사람은 백신(Tdap)을 추가 접종하는 것이 좋습니다. Tdap 접종을 하지 않은 경우 접종을 하시기 바랍니다. Tdap 백신은 병원, 일부 약국, 지역 보건 기관에서 보통 구입할 수 있으며 대부분의 건강 보험에서 보장합니다.

자녀가 감기와 유사한 증상이 있거나 기침을 하는 경우 의사의 진료를 받으십시오. 자녀의 보육원에서 백일해 발병이 확인 되었다고 의사에게 알려십시오. **의사가 자녀를 진찰한 후 백일해 진단을 내린 경우 5 일간 처방된 항생제 치료를 마칠 때까지 자녀를 집에서 보호하십시오.** 가장 정확한 백일해 진단 방법은 코 분비물 검사입니다.

항생제는 백일해 전염을 예방할 수 있으며 백일해 환자에게 복용이 권장됩니다. 백일해가 심해질 위험이 크거나 발병 위험이 큰 사람에게 전염시킬 수 있는 보균 의심자는 항생제를 복용하여 백일해를 예방해야 합니다. 이러한 보균 의심자에는 1 세 미만의 유아와 임신 3 기의 임신부, 유아 또는 임신부와 함께 근무하는 사람이 포함됩니다.

1세 미만의 유아, 특히 6개월 미만의 유아는 백일해에 걸릴 경우 그 증세가 매우 심할 가능성이 높습니다. 유아는 최대한 기침을 하는 사람과 가까이 하지 않아야 합니다. 호흡 곤란 또는 기침 증상이 있는 유아는 즉시 의사의 진단을 받아야 합니다.

지역 보건부가 지속적으로 상황을 조사할 것입니다. 부모님 또는 담당 의사가 질문이 있을 경우 다음 연락처 정보를 이용해 문의해주시시오 (.

감사합니다.