

什么时候服药？

我将在餐后服药：

早餐 午餐 晚餐



在服药日对应的方框打对勾，下次约见医生时，携带此服药记录。

以下是我的服药记录：

	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
EX	<input type="checkbox"/>						
1	<input type="checkbox"/>						
2	<input type="checkbox"/>						
3	<input type="checkbox"/>						
4	<input type="checkbox"/>						
5	<input type="checkbox"/>						
6	<input type="checkbox"/>						
7	<input type="checkbox"/>						
8	<input type="checkbox"/>						
9	<input type="checkbox"/>						
10	<input type="checkbox"/>						
11	<input type="checkbox"/>						
12	<input type="checkbox"/>						

漏服了一天？您可以在两天内补服漏了的药。



如果漏服超过一天，请联系医生。

保护您和您的家人。 接受治疗。



下次就诊：

日期：


地址：

电话：

请随身携带您的服药记录



了解更多有关潜伏性肺结核病的信息，请浏览
bit.ly/CDPHTB



TB free CALIFORNIA

服用 12 剂药物，给肺结核病画上休止符。



这些药是治疗什么疾病？

您感染了潜伏性肺结核病 (LTBI)

虽然您可能并未感到不适，但现在服用药物可以防止您和您的家人将来罹患严重疾病。

开始服药前有什么注意事项？

与您的医生一同审查您现在服用的所有药物。



包括避孕药、华法林（香豆素）、糖尿病药物、非处方药和营养补充剂。

我该如何服药？

每周一次服用所有 10 粒药（一次一粒），持续 12 周

6 片利福喷丁（红色）



3 片异烟肼（白色）



1 粒维生素 B6



您必须服完所有 12 周的剂量。

服药期间会怎样？

严重的副作用很少见。但是，在接受治疗期间，有些人可能需要每月前来就诊并抽血化验。



如果您出现以下情况，请停止服药并联系诊所：

- ✓ 恶心、呕吐、腹泻、腹痛或胃痉挛
- ✓ 发烧
- ✓ 皮疹或瘙痒
- ✓ 眼睛或皮肤发黄
- ✓ 食欲降低或失去食欲
- ✓ 严重的疲倦感或虚弱感
- ✓ 手脚或关节疼痛、刺痛或麻木
- ✓ 感到虚弱、晕眩或头昏眼花
- ✓ 尿液颜色变深（注意：红色/橙色尿液是正常的）。



治疗期间请避免饮酒。