

Protéjase a usted y a su bebé de la sífilis



¡Hágase la prueba!

Se puede contraer sífilis y otras ITS más de una vez. Si necesitas hacerte la prueba o quieres más información sobre cómo protegerte a usted y su bebé, hable con su médico o acérquese a un centro de salud.

Estas clínicas ofrecen pruebas y tratamiento de ITS y servicios de planificación del embarazo GRATUITOS o A BAJO PRECIO.

Nombre de la clínica1
Calle Dirección Ciudad
Teléfono: xxx.xxx.xxxx
Horario de la clínica (L-V, xx-xx)

Nombre de la clínica4
Calle Dirección Ciudad
Teléfono: xxx.xxx.xxxx
Horario de la clínica (L-V, xx-xx)

Nombre de la clínica2
Calle Dirección Ciudad
Teléfono: xxx.xxx.xxxx
Horario de la clínica (L-V, xx-xx)

Nombre de la clínica5
Calle Dirección Ciudad
Teléfono: xxx.xxx.xxxx
Horario de la clínica (L-V, xx-xx)

Nombre de la clínica3
Calle Dirección Ciudad
Teléfono: xxx.xxx.xxxx
Horario de la clínica (L-V, xx-xx)

Nombre de la clínica6
Calle Dirección Ciudad
Teléfono: xxx.xxx.xxxx
Horario de la clínica (L-V, xx-xx)

Para obtener una lista completa de clínicas gratuitas o de bajo costo cerca de usted, visite:

<https://gettested.cdc.gov/> o llame al Departamento de Salud Pública al xxx-xxx-xxxx.

LOGOTIPO DEL
DEPARTAMENTO DE
SALUD DEL CONDADO
AQUÍ



¿Qué es la sífilis congénita (SC, por sus siglas en inglés)?

La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS).

La sífilis congénita se produce cuando una persona embarazada con sífilis transmite la infección al feto.

Puede causar problemas graves, como parto prematuro, bajo peso al nacer, malformaciones congénitas y mortinatalidad.

¿Cuáles son los síntomas de la sífilis?

La mayoría de las personas con sífilis presentan síntomas como una llaga o una erupción cutánea. Aunque los tengan, es posible que no los noten.

La única forma de saberlo con seguridad es hacerse la prueba. Hacerse la prueba de la sífilis forma parte de los cuidados prenatales rutinarios.

¿Quién debe hacerse la prueba?

Si está embarazada o podría quedar embarazada, es importante que reciba atención prenatal rutinaria.

Hacerse la prueba de la sífilis y otras ITS forma parte de los cuidados prenatales rutinarios.

Las embarazadas deben someterse a pruebas de sífilis en la primera visita prenatal, de nuevo durante el tercer trimestre y en el momento del parto.*

Asegúrese de obtener los resultados de la prueba de la sífilis y siga los consejos médicos que le indiquen en ese momento.

*A menos que sea poco probable la exposición a la sífilis
Y con una prueba de sífilis negativa documentada en el tercer trimestre.

¿Cómo se trata la sífilis?

La sífilis puede curarse, incluso durante el embarazo. Un tratamiento adecuado ayudará a evitar que su bebé se infecte.

Asegúrese de informarle a su pareja sexual porque también tendrán que someterse a las pruebas y al tratamiento. Esto les ayudará a mantenerse sanos, a evitar infectar a otros y a evitar reinfectarte a ustedes.



Las clínicas que aparecen en la portada de este folleto ofrecen pruebas y tratamiento de ITS y servicios de planificación del embarazo GRATUITOS o A BAJO COSTO.