

Mujeres de California, la sífilis está en aumento

HÁGASE LA PRUEBA

Prevenga la sífilis congénita

La sífilis:


- Es causada por una infección transmitida por contacto sexual.
- En California, está en aumento entre las mujeres de edad fértil.

La sífilis puede:


- Ser transmitida a los bebés durante el embarazo o durante el parto, y poner la vida en riesgo.
- Ser curada. Hay maneras de protegerse y proteger a su bebé.

Todas las mujeres embarazadas deben hacerse la prueba de la sífilis en su primera visita de atención prenatal.

Las mujeres con mayor riesgo* de contraer la sífilis deben volver a someterse a una prueba durante el tercer trimestre y en el momento del parto.



Primer Visita:
todas las mujeres embarazadas



28 semanas:
mujeres en alto riesgo



Parto:
mujeres en alto riesgo

*Muchas regiones del sur de California y el Valle de San Joaquin actualmente recomiendan una prueba de la sífilis en el tercer trimestre y en el momento del parto para todas las mujeres embarazadas. Sin embargo, algunas mujeres embarazadas que viven fuera de estas áreas también pueden beneficiarse de múltiples pruebas durante el embarazo. Pregúntele a su médico si debe hacerse la prueba de sífilis nuevamente en el tercer trimestre y en el momento del parto.

Si tiene preguntas sobre la sífilis, comuníquese con su proveedor de atención médica y visite: <https://www.cdc.gov/std/spanish/sifilis/stdfact-syphilis-s.htm>

Departamento de Salud Pública de California,
Rama del Control de ETS, www.std.ca.gov

Adaptado con permiso del Departamento de Salud de Minnesota