

ປ້ອງກັນຕົວເອງຈາກໄຂ້ຫວັດນົກ ເມື່ອເຮັດວຽກກັບ ງົວນົມທີ່ຕິດເຊື້ອ

ໄຂ້ຫວັດນົກສາມາດແຜ່ກະຈາຍຈາກສັດໄປສູ່ຄົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເປັນໄຂ້ໄດ້.

- ໄວຮັສສາມາດຢູ່ໃນນົມດິບ, ຂອງແຫຼວຂອງສັດ ຫຼື ເທິງພື້ນຜິວ.
- ມັນສາມາດແຜ່ກະຈາຍຜ່ານການກະເດັນຂອງຂອງແຫຼວ, ຂີ້ຝຸ່ນ ຫຼື ລະອອງນ້ຳໃນອາກາດ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຂົ້າໄປໃນຕາ, ດັງ, ປາກ ແລະ ປອດໄດ້.
- ນອກຈາກນີ້ ມັນຍັງສາມາດແຜ່ກະຈາຍໄດ້ ຫາກເຈົ້າສຳຜັດກັບພື້ນຜິວທີ່ຕິດເຊື້ອ ແລະ ຈາກນັ້ນສຳຜັດກັບໜ້າຂອງເຈົ້າ.



ປ້ອງກັນຕາ, ດັງ ແລະ ປາກຂອງເຈົ້າ.

ສວມໃສ່ຊຸດເຄື່ອງມືປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ (PPE) ເມື່ອເຮັດໜ້າວຽກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ເຊັ່ນ:

- ການລິດນົມງົວ, ການຈັດການກັບນົມງົບດິບ ຫຼື ການອະນາໄມທ້ອງລິດນົມ.
- ການດູແລງົວທີ່ບໍ່ສະບາຍ ຫຼື ການອະນາໄມຄອກຂອງພວກມັນ.
- ການຈັດການກັບງົວທີ່ຕາຍແລ້ວ ຫຼື ການອະນາໄມຄອກຂອງພວກມັນ.



ສວມໃສ່ແວ່ນຕານິລະໄພ (ແວ່ນຕານິລະໄພ ແບບມີຊ່ອງລະບາຍອາກາດທາງອ້ອມ) ຫຼື ໜ້າກາກປ້ອງກັນເພື່ອປ້ອງກັນຂອງແຫຼວ ກະເດັນ. ແວ່ນຕານິລະໄພຈະປ້ອງກັນໄດ້ດີກວ່າ ໜ້າກາກປ້ອງກັນ. ໜ້າກາກປ້ອງກັນຈະຊ່ວຍ ເຮັດໃຫ້ຜ້າມຸບປາກແຫ້ງ.



ສວມໃສ່ເຄື່ອງຊ່ວຍ ຫາຍໃຈ N95 ຫຼື ທີ່ ດີກວ່າເພື່ອປ້ອງກັນຈາກ ໄວຮັສໃນອາກາດ.



ສວມໃສ່ຖົງມື ແລະ ຢ່າ ສຳຜັດກັບໜ້າຂອງເຈົ້າ ເດັດຂາດ.



ລ້າງ ຫຼື ອະນາໄມມືຂອງເຈົ້າ ເລື້ອຍໆຂະນະທີ່ເຮັດວຽກ. ກ່ອນໜ້າຈະກັບບ້ານ, ໃຫ້ລ້າງມື ແລະ ລ້າງໜ້າ.

ນາຍຈ້າງຂອງເຈົ້າຕ້ອງເປັນຄົນຈັດຫາຊຸດ PPE ທັງໝົດໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ຫາກເຈົ້າມີອາການຄ້າຍກັບເປັນໄຂ້ຫວັດ ລວມທັງຕາແດງ ຫຼື ມີນ້ຳມູກໄຫຼ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງເຈົ້າ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມ ເບິ່ງ:

ໜ້າເວບກ່ຽວກັບໄຂ້ຫວັດນົກຂອງ CDPH: go.cdph.ca.gov/birdflu
ຄຳຖາມ: ລະບົບການປະເມີນອັນຕະລາຍ ແລະ ການເລີກການຊຸ້ນຂ່າວສານ (HESIS)
ສາຍດວ່ນອັນຕະລາຍໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: (866) 282-5516

