

## Preguntas Frecuentes

### Módulo 4 IPC mientras se brinda cuidado de la piel, el perineo y el catéter urinario a los residentes

**Notas para el facilitador:** Cada módulo de Project Firstline CNA está diseñado para proporcionar 30 minutos de contenido de entrenamiento con una discusión después del entrenamiento opcional utilizando los archivos de preguntas frecuentes. Use cualquiera o todas las preguntas frecuentes a continuación para iniciar una discusión adicional entre CNA después de los entrenamientos, durante las reuniones de equipo, etc.

#### Cuidado del catéter urinario

**1. ¿Qué hago si un catéter se desprende del tubo?**

Informe inmediatamente a la enfermera; no vuelva a colocar el catéter. Un catéter desprendido abre un sistema cerrado a los gérmenes que fácilmente pueden causar infecciones. Piense en lo que podría haber en la ropa de cama y cuántos gérmenes están presentes para contaminar el catéter. Familiarícese con las políticas y procedimientos (P&P) de su centro; las P&P deben incluir la forma adecuada de desinfectar las partes que se conectan antes de volver a conectarlas. También puede haber una política para que la enfermera retire el catéter y vuelva a insertar uno nuevo.

**2. ¿Se les permite a los CNA recolectar muestras de catéteres urinarios?**

No, esto no está en el ámbito de práctica de un CNA. Si se le pide que tome una muestra, hable con su especialista en prevención de infecciones para revisar las políticas y los procedimientos de su centro.

**3. ¿Puedo usar el mismo recipiente para drenar bolsas de catéter entre ambos residentes en la misma habitación?**

No. El uso del mismo contenedor para diferentes residentes aumenta el riesgo de contaminación cruzada y la posibilidad de propagar infecciones. Utilice un contenedor nuevo para cada residente. Además, para los residentes en la misma habitación, lávese las manos después de drenar la bolsa del catéter de un residente y antes de drenar la bolsa del catéter del otro residente.

**4. ¿Con qué frecuencia debo cambiar el contenedor de drenaje?**

Es una práctica común cambiar el contenedor de drenaje cada 24 horas. Escriba la fecha del cambio en el contenedor para saber cuándo cambiarlo a continuación. Incluya el nombre del residente para disminuir la posibilidad de usar el contenedor con un residente diferente.

**5. ¿Qué es una bolsa digna?**

Una bolsa de dignidad es una bolsa que se usa para cubrir y sostener la bolsa de recolección/drenaje del catéter para que no sea visible. Las bolsas de dignidad deben

mantenerse secas y limpias (cambiarse regularmente) y no deben interferir con la función del catéter o su drenaje.

## Referencias

- [About Project Firstline | Centers for Disease Control and Prevention \(CDC\)](http://www.cdc.gov/infectioncontrol/projectfirstline/about.html)  
(www.cdc.gov/infectioncontrol/projectfirstline/about.html)
- [Catheter-Associated Urinary Tract Infections \(CAUTI\) | Centers for Disease Control and Prevention \(CDC\)](http://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/cauti/index.html)  
(www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/cauti/index.html)
- [Clean care for all – it's in your hands | World Health Organization \(WHO\)](http://www.who.int/campaigns/world-hand-hygiene-day)  
(www.who.int/campaigns/world-hand-hygiene-day)
- Fuzy, J. (2019). *Hartman's Nursing Assistant Care: The Basics*. Hartman Publishing.
- [Infection Prevention Tools | Centers for Disease Control and Prevention \(CDC\)](http://www.cdc.gov/longtermcare/prevention/index.html)  
(www.cdc.gov/longtermcare/prevention/index.html)
- [Nursing Home and Assisted Living \(Long-term Care Facilities \[LTCFs\]\) | Centers for Disease Control and Prevention \(CDC\)](http://www.cdc.gov/longtermcare)  
(www.cdc.gov/longtermcare)