

학부모(보호자)님, 안녕하십니까:

귀하의 자녀가 학교에서 백일해에 노출되었을 가능성이 있음을 알려드리고자 이 통신문을 보내드립니다.

백일해는 박테리아에 의한 질병으로 전염성이 매우 강하며 이 질병에 걸린 사람이 기침할 때 가까이 접촉할 경우 전염될 수 있습니다. 감염 후 5 - 21 일 사이에 증상이 나타날 수 있습니다.

초기 증상은 대체로 일반 감기와 유사하고(예: 재채기, 콧물 등). 그 후 기침이 나며 1 - 2 주에 걸쳐 기침이 심해집니다. 백일해에 감염된 사람은 기침할 때 숨을 쉴 수 없을 정도의 발작적 기침을 할 수도 있습니다. 어떤 환자는 숨을 쉴 때 쉿쉿 소리가 크게 나고 구토가 나거나 숨이 막히는 것 같습니다. 보통 백일해는 열이 나지 않습니다.

DTaP 백신 접종을 마치지 않은 어린 아동의 경우 특히 심각한 백일해 합병증에 걸릴 위험이 있습니다. 백일해 백신 접종은 2, 4, 6 세 및 15 - 18 개월 때 하는 것이 좋습니다. DTaP 는 4-6 세 유치원 입학 전에 추가 접종을 하십시오. Tdap 추가 접종은 11-12 세 중학생 때 하는 것이 좋습니다. 예방 접종 기록을 확인하거나 자녀의 담당 주치의에게 문의하여 권장하는 DTaP 접종을 모두 마쳤는지 확인하시기 바랍니다.

일반적으로 백일해 백신은 백신 접종 또는 추가 접종을 하면 바로 질병을 예방하거나 증상을 완화하는 효과가 매우 뛰어납니다. 그러나 백일해 접종 효력은 시간이 지남에 따라 사라지므로 백신 접종을 완전히 마친 아동도 백일해에 걸릴 수 있습니다.

11 살 이상인 모든 사람, 특히 임신부와 유아를 돌보는 사람은 백신을 추가 접종(Tdap)하시기 바랍니다. 귀하 또는 자녀가 Tdap 접종을 하지 않은 경우 접종을 하시기 바랍니다. Tdap 백신은 일반 병원, 일부 약국, 지역 보건 부서에서 대체로 접종할 수 있으며 대부분의 건강 보험에서 보통 그 비용을 보장합니다.

자녀가 감기 증상이 있고 기침을 하는 경우 의사에게 진료를 받으십시오. 자녀가 다니는 학교에 백일해 확진을 받은 환자가 있다고 의사에게 알려십시오. 가장 정확한 백일해 진단 검사는 비강 면봉을 사용하여 실시됩니다. 의사가 자녀를 진료 후 백일해 진단을 내린 경우 처방된 항생제 치료가 진행되는 5 일 동안 자녀를 등교시키지 마십시오.

지역 보건부가 지속적으로 상황을 조사할 것입니다..부모님 또는 담당의사에게 질문이 있을 경우 다음 연락처 정보를 이용해 문의해주시십시오.

감사합니다.